

lijk afkomstig uit het zgn. Buurtbos, waar de bosrank groeit).

Bijzondere vermelding verdient de vangst van één exemplaar van *Sedina büttneri* Hering, welke soort naar ook uit vangsten op andere plaatsen blijkt, waarschijnlijk niet zo sterk aan een bepaald biotoop is gebonden als aanvankelijk werd vermoed, en voorts de vangst van acht exemplaren van *Harpyia bicuspis* Bkh. De data, waarop deze met de vanglamp zijn gevangen, zijn 8 en 20 juni 1953, 18 en 19 juni 1954 en 8 en 9 augustus 1953. Mogelijk is er dus sprake van twee generaties. Uit het aantal dieren, dat is gevangen, blijkt wel, dat deze soort een bestanddeel vormt van de fauna van de Hullenberg.

Samenvattend kan worden opgemerkt, dat een relatief groot aantal Macrolepidoptera op de Hullenberg is waargenomen. Een deel hiervan is ongetwijfeld indigeen, een ander deel behoort feitelijk thuis in aangrenzende biotopen, nl. het lage land van de Gelderse vallei ten westen van de Hullenberg en de hogere zandgronden ten oosten en noordoosten van de Hullenberg. De ligging van de Hullenberg en het wisselend karakter van het terrein zelf, maken dit tot een interessant waarnemingsgebied.

Summary

A summary is given of the Macrolepidoptera fauna of the Hullenberg near Bennekom (province of Guelderland). Altogether 529 species of Macrolepidoptera have been found on this plot of about 200 hectares.

Literatuur

CETON, J. C., 1940, De Hullenberg. *De Levende Natuur* 45: 178—189.
Bennekom, Hullenberglaan 7.

Sterke kolonie van *Thera juniperata* L. in het polderland. In de schemering van de 8ste oktober 1956 werd mijn aandacht getrokken door twee spannertjes, die op het verlichte raam van een etalage in Oosthuizen (N.H.) zaten. Ik dacht aanvankelijk met wat vroege exemplaren van *Operophtera brumata* L. te doen te hebben en nam ze daarom toch maar mee in een lucifersdoosje. Thuis bleek echter al gauw, dat het niet deze soort was, maar *Thera juniperata*. Daar ik dit spannertje nog nooit in het polderland had aangetroffen, ging ik de volgende avond natuurlijk weer de etalages langs, wat me nog drie stuks opleverde.

De daarop volgende morgen bekeek ik de heesters, die langs de weg in een plantsoentje staan, eens nader. Er bleken verschillende exemplaren van *Juniperus sabina* L. bij te zijn, waarop zich ook een paar stuks van de vlinder bevonden. Maar 's avonds waren de struiken bezaaid met vlinders, vele in copula. Ik verzamelde er toen een flinke serie van, die duidelijk laat zien, dat de soort nogal variabel is.

Van de tuinman vernam ik, dat de heesters 10 jaar geleden op een bekende kwekerij te Zeist gekocht waren. Natuurlijk waren die toen met eieren van *juniperata* bezet geweest. Blijkbaar heeft het de soort niet de minste moeite gekost zich in de nieuwe omgeving te handhaven.

S. DE BOER, Bredehof 22, Oosthuizen.