

rie", Leiden; paratypes in coll. Division of Entomology, Faculty of Agriculture, Bogor; in Museum Zoologicum, Bogor; in U.S. National Museum and in British Museum.

Type locality: Bogor, West Java, March 1954, "ex imago *Empoasca sundaica* Bergman from *Arachis hypogaea*".

A second species of *Aphelopus* was reared also from adults of *Empoasca sundaica*. This species is entirely straw-yellow, except for the red ocelli and mandibulae and some of the apical segments of the antennae which are dark brown. The head is slightly darker than thorax and abdomen and relatively larger than in *A. maculiceps*.

Another *Aphelopus* species was reared from adults of *Erythroneura tripunctula* (Melich.). This species is completely black except for the ivory-white legs and the antennae, which are straw-yellow. The stigma is rather dark and the wasp is somewhat smaller than *A. maculiceps*, especially the head.

Since both species are rather rare, it was not possible to obtain sufficient numbers for adequate descriptions and drawings.

References

- MUIR, F., 1916, Notes on the sugar-cane hoppers and borers in the Malay States and Java. *Rep. exp. Sta. Hawaii Sug. Planters Ass., Bull.* 13: 58—64.
 PERKINS, R. C. L., 1912, Parasites of the family Dryinidae. *Rep. exp. Sta. Hawaii. Sug. Planters Ass., Bull.* 11.
 ROEPKE, W., 1916, Eine neue Dryinide aus Java (*Phanerodryinus javanus* nov. g., nov. sp.). *Tijdschr. Ent.* 59: 287—292.

e/o Instituut voor Rationele Suikerproductie, Bergen op Zoom, Netherlands.

Vroege exemplaren van *Gymnoscelis pumilata* Hb. In de afgelopen wintermaanden gelukte het mij hier te Raalte een zestal exemplaren van *G. pumilata* Hb. te vangen. Ze werden allen binnenshuis buitgemaakt, gedeeltelijk in de huiskamer, gedeeltelijk in de keuken. De vangdata zijn de volgende: 10 oktober en 17 november 1955; 16 januari, 4, 15 en 22 februari 1956, telkens één exemplaar.

Bij het doornemen van de *Ent. Ber.*, deel 15, zag ik, dat op blz. 64 door de heer BENTINCK een exemplaar van 26 december wordt vermeld en op blz. 185 geeft de heer HERWARTH VON BITTENFELD een exemplaar van 12 februari op. Met deze vangsten zijn alle overwinterende maanden van *pumilata* bezet. De vangst van 10 oktober zal wel tot de partiële derde generatie behoren, temeer daar in de nazomer augustus warm en september normaal weer te zien gaf. De vangsten van 4, 15 en 22 februari 1956 zijn merkwaardig. Ze vullen midden in de hevigste koudegolf, welke we ooit gehad hebben.

G. J. FLINT, Roggestraat 1b, Raalte.

[De vlinders, die in januari en februari 1956 gevangen werden, moeten afkomstig geweest zijn van rupsen, die zich binnenshuis verpopt hebben. Daar de vlinder bij *pumilata* reeds vóór de winter kant en klaar in de pop zit, is het al heel gemakkelijk hem midden in de winter „er uit te stoken". — LPK.]

Te koop gevraagd: alle soorten insecten, doch alleen grote en middelgrote soorten (geen Lepidoptera), goed geprepareerd en voorzien van de thans geldige wetenschappelijke benamingen.

M. KOOI, Rembrandt van Rijnstraat 22, Groningen.