

**Veturius louwerensi nov. sp.**

Both mandibles with two terminal teeth. The labrum is straight in front. Surface of head shining, without hair-bearing punctures. Central tubercle low, linear, its apex slightly pointed in profile, but not free; parietal ridges obsolete, frontal ridges absent; inner tubercles minute. Clypeus vertical, rather narrow, its anterior margin straight. Antennae with three short, stout, lamellae. Mentum with coarse, hair-bearing punctures.

Pronotum transverse, the anterior margin lightly biconvex, marginal grooves narrow posteriorly, a little broadened anteriorly and in front, and broadly incomplete there; surface of pronotum shining, without punctures, the scars obsolete, the median groove very pronounced but incomplete in front, lower surface of pronotum with scattered punctures and hairs. Scutellum punctured. Mesosternum shining, smooth, with only a few hairbearing punctures in the anterior angle.

Metasternal plate and intermediate areas fused, wholly smooth and shining, lateral areas rather narrow, somewhat broadened but incomplete posteriorly. The whole metasternum, lateral areas included, without hairs or punctures. Shoulders of elytra without a tuft of hair, the grooves of the elytra well pronounced, but feebly punctured. Middle and hind tibiae each with one spine. All legs very feebly hairy.

Length, 25 mm.

Holotype: Magdalena Valley, La Cimitarra Vic (virgin forest), Colombia, II.1956, C. J. LOUWERENS Jr. leg., in the author's collection. Paratype: one specimen, with the same data, in the collection of C. J. LOUWERENS Sr.

By its smallness *V. louwerensi* is much like *V. assimilis* Weber, from which it differs by the two terminal teeth of the mandibles without any trace of a third tooth. It differs from all species of *Veturius* known to the writer by the lateral areas of the metasternum which are completely devoid of hairs or punctures.

Baarn, Holland, Cantonlaan 1.

---

*Cucullia asteris* Schiff. Begin september 1956 zagen de bloemen van mijn *Aster amellus* er al buitengewoon gehavend uit. Geen wonder, want er genoten maar liefst een stuk of vijftien rupsen van *Cucullia asteris* van. Bij zonnig weer zaten de prachtige dieren open en bloot op de bloemen, waarvan het ene bloemblaadje na het andere verdween. Bij donkerder weer zaten ze meest langs de stengel vlak onder de bloem.

Erg kieskeurig zijn ze overigens niet. Ik vond ook een haast volwassen rups op *Aster frikartii*. De eenjarige zaaiasters (*Callistephus sinensis*), die anders ook graag gegeten worden, hadden er dit maal weinig last van. Ik zag slechts één enkele uitgegeten bloembodem als zeker bewijs, dat er een *asteris*-rups aan geknabbeld had. — LPK.

**Bibliografie:** Over deel 4 van VOET's Beschreibungen und Abbildungen hartschaaliger Insecten door G. W. F. PANZER.

In de schenking, die wijlen Dr D. MAC GILLAVRY aan onze Vereniging deed bij het bereiken van de 80-jarige leeftijd in 1949, bevindt zich het in de titel genoemde werk. Bij het collationeren blijkt, dat deel 4 120 pagina's telt in plaats van, zoals steeds opgegeven wordt, 112 pag. De laatste bladzijde is nl. met 112 gepagineerd, maar dit is een drukfout voor 120, zoals uit de overige bladzijden van dit laatste vel blijkt. — KR.