

- HANSEN, H. J., 1904, The genera and species of the order Symphyla. *Quart. Journ. micr. Sc.*, n. s. 47: 1—101.
- JUPEAU, L., 1954, Contribution à l'étude des Symphyles du Cameroun. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2), 26: 593—595.
- , 1954, Contribution à l'étude des Symphyles de Nosy-Bé et de la Réunion. *Mem. Inst. scient. Madag.*, A 9: 105—127.
- MICHELbacher, A. E., 1942, A synopsis of the Genus *Scutigera*. *Ann. ent. Soc. Amer.*, 35: 267—288.
- ROCHAIX, B., 1955, Symphyles des Dolomites. *Atti dell'Istituto Veneto di Scien.*, 1954—55, 113: 11—18.

---

Enkele vlindernotities over 1956. *Citria lutea* Ström was gewoon in allerlei vormen. O.a. trof ik f. *obsoleta* Lempke aan en een exemplaar, dat alle rode of paarsachtige kleur mist. De tekening is bij dit dier zuiver sepiakleurig.

*Catocala nupta* L. was te Hoog-Keppel in september uiterst gewoon op smeer. Eén exemplaar had de rechter achtervleugel grijs in plaats van rood gekleurd.

*Lacanobia glauca* Hb. Het eerste exemplaar verscheen in 1956 op 16 mei. De nu bekende vliegtijd loopt dus van 16.V tot 16.VI.

*Enargia paleacea* Esper was op licht en smeer een geregelde gast. De variabiliteit is zeer gering.

*Lithomoia solidaginis* Hb. was zeer gewoon. Op 1 oktober kwamen nog drie verse exemplaren op licht.

*Orthosia opima* Hb. Op 1 mei kwamen liefst vijf exemplaren op de lamp af te Wiessel. Hierbij was ook een ♀, dat ik levend meenam. Het legde in enkele dagen ongeveer 200 eieren. Een aantal ervan werd door de heer GORTER met bosbes opgekweekt. Van kannibalisme bij de rupsen bleek hem niets. Waarschijnlijk treedt dit alleen op, als er een voedseltekort is. Op 7 mei kwam nog een vers ♂ op licht af. Daarna heb ik de soort niet meer gezien, maar het werd ook kouder.

*Drymonia trimacula* Esper. In juni ving ik te Hoog-Keppel een exemplaar van f. *dodonaea* Hb. Ik vind het maar merkwaardig, dat ook te Colmschate en op De Voorst vrijwel alle dieren donker zijn, terwijl ik zulke exemplaren op de Veluwe nog nooit aangetroffen heb.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.

Kweek van *Orthosia opima* Hb. Door bemiddeling van de heer LEMPKE ontving ik een aantal eieren van een door de heer BOER LEFFEF gevangen ♀. Helaas was ik enkele dagen van huis en waren de dieren al uitgekomen, toen ik thuis kwam. Wat nog leefde heb ik onmiddellijk berk te eten gegeven, maar natuurlijk was het voor de meeste al te laat. Tenslotte hield ik er nog vier over en deze heb ik in waspotjes met berk verder gekweekt. Het heeft me verwonderd, hoe goed de kweek in zo'n kleine ruimte ging. Afdedekt met een stukje papier, omgekeerd neergezet en om de twee dagen een paar verse berkeblaadjes er in, dat was alles. Helaas had ik met een van de bijna volwassen rupsen een ongelukje. Aanvankelijk scheen het dier er geen last van te hebben, maar na een week zag ik wel, dat het mis ging. Ik heb de rups toen dadelijk geprepareerd, zodat we nu tenminste ook een authentieke Nederlandse *opima*-rups rijk zijn.

De andere drie rupsen zijn ter verpopping in de grond gekropen. Het is mij echter een raadsel, hoe LEFFEF er in slaagde zo'n flinke rups in een aspirinebuisje groot te krijgen.

G. S. A. VAN DER MEULEN, Van Breestraat 170, Amsterdam-Z 1.

---