

Nous publierons très prochainement la description du neotype de *Bryobia speciosa* C. L. Koch 1838.

Il est à remarquer que les fortes soies figurées dans la planche (Fasc. LI, No. 1) de BERLESE ne sont pas le fait d'une erreur du dessinateur car nous avons récolté nous même en France et en Italie des *Bryobia* identiques ou très voisins qui montrent ce caractère si frappant.

En conséquence, comme il s'agit chez BERLESE d'une espèce distincte, mais dont l'identification est erronée, nous donnons à celle-ci le nom de **Bryobia berlesei** nom. nov. = *Bryobia speciosa* Berlese 10.XII.1888, Acar., Myr., Scorp., fasc. LI, No. 1 (*non* C. L. Koch 1.III.1838, Deutsch. Crust., Myr., Arachn., fasc. 17, pl. 10).

Amsterdam, Zoölogisch Museum.

Enkele merkwaardige spinnen

door

P. CHRYSANTHUS O.F.M. Cap.

Op de Lentevergadering (8 april 1956) vertoonde ik enkele merkwaardige spinnen: een fel-oranje gekleurde kruisspin, *Araneus diadematus* Cl., de vrij zeldzame zwarte mijns spin, *Atypus affinis* Eichw., de beide kleurvariëteiten van de „korstmos-krabspin”, *Philodromus margaritatus* (Cl.) en een exemplaar van *Silometopus interjectus* Cbr. (Micryphantidae).

Deze laatste soort (♀, Terschelling, wad, augustus 1954; leg. Dr. P. F. VAN HEERDT, Utrecht) is echter niet nieuw voor onze fauna, zoals ik ter vergadering meende. VAN HASSELT heeft nl. reeds een ♂ te Wassenaar gevangen (Catalogus Araneorum hucusque in Hollandia inventarum, Suppl. 2, *Tijdschr. Entom.* 33, 1890). Naderhand werd de soort nog gevonden te Riel, ♀, 5.IV.1956; leg. J. BOEMAARS.

De andere soort, die ik op de vergadering liet rondgaan is echter wel nieuw voor onze fauna nl. **Enoplognatha maritima** Simon F.n.sp.

Enkele ♀♀ van deze kogelspin (Theridiidae) werden door Dr. P. F. VAN HEERDT aan de wadzijde van Terschelling gevangen in augustus 1954. Dit dier is vooral van de kusten bekend, waar ze haar web maakt aan de voet van zoutplanten: Frankrijk (N.W.- en Z.-kust), Denemarken, Duitsland (Borkum); toch komt ze ook wel in het binnenland op struiken voor, ook in andere Europese landen. BONNET schrijft in zijn Bibliographia Areneorum (vol. 2, 2me partie, Toulouse 1956, p. 1662), dat SCHNEIDER de soort van Nederland heeft vermeld. Diens verhandeling (*Abb. Naturw. Ver. Bremen*, 16 (1900), p. 1—174) betreft echter de dieren van Borkum en enkele andere Duitse waddeneilanden; noch in de inleidende tekst, noch in de soortenlijst bij *E. maritima* (p. 151) is enige aanwijzing te vinden, dat hij dit dier ook op Nederlands gebied zou gevangen hebben. WIEHLE (*Tierwelt Deutschlands — Spinnentiere*, vol. 8, Jena 1937) geeft de soort dan ook niet voor ons land op. Waarschijnlijk heeft BONNET Borkum tot de Nederlandse waddeneilanden gerekend.

In de maanden, die sedert de Lentevergadering verlopen zijn, heb ik nog de volgende soorten aan mijn collectie kunnen toevoegen, welke nog niet eerder van ons land bekend waren:

Clubiona similis L. Koch (Clubionidae) F.n.sp.

♀ ♂, Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. VAN HEERDT.

♂, Oosterhout, juni 1956; leg. J. BOEMAARS.

♂, Riel, augustus 1956; leg. J. BOEMAARS.

Volgens REIMOSER (Die Tierwelt Deutschlands — Spinnentiere, vol. 8) hoort dit dier in Midden- en Oost-Europa thuis; TULLGREN (Svensk Spindelfauna, vol. 1, Stockholm 1944) geeft echter verschillende vindplaatsen uit Zweden op. De soort is vaak verwisseld met *C. neglecta* Cbr. en ik geloof, dat ook REIMOSER dit, minstens gedeeltelijk (♀), heeft gedaan; bij gelegenheid hoop ik hierop nader terug te komen.

Agroeca lusatica (L. Koch) (Clubionidae) F.n.sp.

♀, Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. VAN HEERDT; van de meeste Europese landen bekend.

Theridium neglectum Wiehle (Theridiidae) F.n.sp.

♂, Oosterhout, hei, op boomstam, 1.V.1956; leg. J. BOEMAARS en T. VAN OOSTERHOUT. Deze soort is pas in 1952 door WIEHLE onderscheiden van de nauw verwante *T. melanurum* Hahn (*Zool. Anz.*, 149 (1952), p. 226—235). Terwijl *melanurum* zeer gewoon is aan en in onze huizen, is *neglectum* een uitgesproken dier van de vrije natuur en wel speciaal op boomstammen te vinden.

Philodromus collinus C. Koch (Thomisidae) F.n.sp.

♂, Oosterhout, juli 1956; leg. J. BOEMAARS en T. VAN OOSTERHOUT; o.a. bekend van Duitsland, Zwitserland en Zweden.

Summary

Five species of Spiders are mentioned, which had not been taken in the Netherlands before.

Oosterhout, Warandelaan.

Cosymbia ruficiliaria H.-S. Gelukkig blijkt deze sierlijke *Cosymbia* nog altijd tot onze fauna te behoren, al is het zeker geen gewone soort. De laatste vangsten dateerden van 1928 (zie Cat. Nederl. Macrolep. VIII: (594), 1949) en pas in 1956 dook de vlinder weer op. Een prachtig vers wijfje werd dat jaar op 31 mei door de heer W. H. SOUTENDIJK te Wiessel op licht gevangen. En nu maar zoeken naar het juiste biotoop! — LPK.

Trekvlinders. Hoewel niet alle waarnemers er aan gedacht hebben, ook notities in te zenden over de niet op de kaart vermelde *Agrotis ypsilon*, zijn de ontvangen gegevens voldoende om te laten zien, dat 1956 geen opvallend goed jaar voor deze soort was. Ik verzoek alle Lepidopterologen dringend ook dit jaar de soort zorgvuldig te noteren.

Denkt U er bovendien om elk plotseling talrijk optreden van een vlindersoort te vermelden. Er worden verschillende soorten van verdacht niet alleen hier inheems te zijn, maar bovendien al of niet regelmatig te trekken. — LPK.