

ook als parasiet van *Lasioderma serricorne* (F.), de tabakskever, aangetroffen.

De soort parasiteert volgens literatuurgegevens in larven en poppen van zijn gastheer.

Literatuur

- BACK, E. A. & COTTON, R. T., 1926, The granary weevil, *U.S. Dept. Agric. Dept. Bull.* 1393, Washington.
- BARE, C. O., 1942, Some natural enemies of stored tobacco-insects, with biological notes, *J. econ. Ent.* 35: 185—189.
- GOODWIN-BAILY, K. F. & HOLBORN, J. M., March 1952, Laboratory and field experiments with pyrethrins/piperonyl butoxide powders for the protection of grain. *Pyrethrum Post.*

Summary

Experiences with *Chaetospila elegans* (Westw.) (Hymenoptera, Pteromalidae), a parasite of some storage insects.

In some wheat samples in which *Chaetospila elegans* was controlled by admixture of an insecticide, the population of grainweevils was decreased to a less extent compared with wheat samples without the insecticide in which the parasites could propagate freely.

It turned out that *Chaetospila elegans* could survive the winter in a storage room with wheat in bulk at temperatures of some degrees (C) below zero (measured also within the grain).

Wageningen, Plantenziektenkundige Dienst.

Aanvulling op „Waarnemingen van zweefvliegen in Noord-Holland ten noorden van Amsterdam”.

Enkele soorten werden nog niet door mij vermeld of werden later gevangen:

97. *Didea intermedea* Lw. Op 4.IX.1955, 11.IX en 17.IX vier ♀♀ en één ♂ bij Bergen-N.H. in de staatsbossen. Men vergelijk de vondst van deze soort op Texel door de heer KABOS !
98. *Epistrophe cinctella* Zett. ♂, Bergen-N.H., Herenbos, 25.VIII.1954.
99. *Ep. vittigera* Zett. ♀, Heiloo, Heiloër bos, 20.V.1956.
100. *Neoscia aenea* Mg. ♀, St. Maartensvlotbrug, natuurmonument Wildrijk, 31.V.1955.
101. *Paragus tibialis* Fall. ♂ en ♀, IJmuiden, ten noorden van de spuisluis, 15.VIII.1949.
102. *Platychirus immarginatus* Zett. ♂, Alkmaar, 5.V.1952.

Mijn hartelijke dank aan de heer VAN DOESBURG Sr. voor de contrôle van enkele determinaties.

V. VAN DER GOOT, Helmholzstraat 18 B, Amsterdam-O.

Xanthorhoë biriviata Bkh. Nadat ik in 1955 te Wiessel het eerste exemplaar voor deze omgeving had gevangen, trof ik in 1956 het tweede aan. De voedselplant komt hier slechts sporadisch voor.

In Colmschate daarentegen was de vlinder eind mei '56 zo talrijk, dat de dieren bij tientallen van de elzestammetjes opvlogen op de groeiplaatsen van het Groot Springzaad. De soort zat echter uitsluitend op de vochtige plaatsen. Op de drogere was geen exemplaar te bekenen.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.