

paper toweling are inserted to serve as pupation areas. The bottles are stoppered with cotton. *Drosophila* adults, placed in a bottle, will start the culture.

The house flies have been reared as follows: In a screen cage (30 × 30 × 50 cm) flies have at their disposal a small dish with food (a mixture composed of dried milk, sugar and yeast — 1 : 1 : 0.2) and a dish containing a water-soaked wad of cotton. A milk-soaked wad of cotton in a third dish serves as oviposition place.

The collected eggs are placed on a 5 cm high layer of soaked dog biscuits, which have been crumbled and poured over with living yeast suspension. This medium, from which the new flies appear 11 days after hatching of the maggots (at 25° C), is situated in a glass jar, between two layers of peat-dust.

Wageningen, Laboratorium voor Entomologie, Gen. Foulkesweg 37.

---

Reyne, A., *Snavelinsecten-Rhynchota, 1. Nederlandse Schildluizen (Coccidae)*. Wetenschappelijke Mededelingen van de Kon. Nederl. Natuurhist. Vereniging, no. 22, maart 1957.

De K.N.N.V. is zo ongemerkt een trouwe bondgenoot van ons geworden. De ene entomologische publicatie na de andere verschijnt in de bekende serie van de Wetenschappelijke Mededelingen en vrijwel uitsluitend over groepen, waarvan een moderne behandeling meer dan urgent is.

Dat Dr. REYNE's boekje over de Schildluizen een voortreffelijk stuk werk is geworden, spreekt wel vanzelf. Van een zo ter zake deskundige was niet anders te verwachten. Het is bovendien op een heel prettige manier geschreven, zodat iemand, die niet in de groep ingewerkt is, de algemene inleiding toch met belangstelling zal doorlezen.

In het systematische gedeelte worden 52 soorten vermeld, die in ons land in de vrije natuur zijn waargenomen. Als men bedenkt, dat de laatste lijst, die van VAN DER GOOT (1912, *Ent. Ber.* 3 : 285—290) slechts 21 van dergelijke soorten telt, dan is het wel duidelijk, dat de nieuwe publicatie geen overbodige weelde is. Van vele der vermelde soorten zijn uitstekende figuren gegeven, die òf het hele dier, òf voor de determinatie belangrijke kenmerken laten zien. Het op naam brengen wordt vergemakkelijkt, doordat een lijst van voedselplanten is gegeven met de soorten, die daarop kunnen voorkomen. Haast onnodig te vermelden, dat van vele soorten nog slechts enkele Nederlandse vindplaatsen bekend zijn.

Het boekje telt 44 pagina's en 56 figuren. De prijs bedraagt voor leden van de K.N.N.V. en van de N.E.V. f. 2,25 (anders f. 2,75) en kan besteld worden bij het Bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud-N.H., postgiro 13028. — LPK.

*Pseudopanthera macularia* L. Dit mooie spannertje vond ik te Hoog-Keppel talrijk. Het biotoop was echter wel wat afwijkend van wat we bij deze soort gewoon zijn. Het was namelijk veenachtig zeggeland met veel moerasandoorn, die hier stellig de voedselplant was. De struiken bestonden uit elzenopslag en eiken van 3 tot 4 m hoog.

De rupsen schijnen flinke afstanden af te leggen voor ze gaan verpoppen. Ik vond tenminste pas uitgekomen vlinders met nog slappe vleugels aan grashalmen op een paadje langs een sparrenbos, dat het terrein aan deze zijde afsloot, zeker een 60 m van de voedselplanten verwijderd.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.

---