

G. KRUSEMAN : Mededeling omtrent de invoer van twee termieten (♂ en ♀) in een boek, dat voor onze Bibliotheek uit Ecuador was gezonden.

De met „*“ gemerkte bijdragen zullen in de Entomologische Berichten worden gepubliceerd.

Daar niemand verder het woord verlangt, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten onder dankzegging aan allen, die tot haar welslagen hebben bijgedragen.

Amsterdam-O., Zeeburgerdijk 21.

Bericht van de Nomenclatuur-Commissie der N.E.V.

LEPIDOPTERA. Enige tijd geleden is door Dr. Elwood C. ZIMMERMAN voorgesteld de naam *Oeobia* (= *Oebia*) Hübner, 1825, op de officiële lijst van genus-namen in de Zoölogie te plaatsen, met type *Pyrallis numeralis* Hübner (*Bull. Zool. Nomencl.* 12 : 248—251).

In vol. 13, part 6, van dit *Bulletin* (28 juni 1957) vermeldt E. MUNROE diverse bezwaren tegen dit voorstel. De bestaande moeilijkheden kunnen volgens hem beter opgelost worden door:

1. de genusnamen *Oeobia* Hübner, emend., en *Oebia* Hübner (1825), voor doeleinden van prioriteit (niet van hononymie) te onderdrukken.

2. de genusnamen *Hellula* Guenée, 1854 (type: *Phalaena undalis* Fabricius, 1781) en *Udea* Guenée 1844 (type: *Pyrallis ferrugalis* Hübner, 1796) op de officiële lijst te plaatsen, etc.

Voor verdere bijzonderheden wordt hier verwezen naar de volledige tekst van ZIMMERMAN's voorstel en het tegenvoorstel van MUNROE. Specialisten wordt verzocht eventueel commentaar toe te zenden aan de Secretaris van de Nomenclatuur-Commissie der N.E.V., Dr. J. VAN DER VECHT, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg, Leiden.

Een droevig voorjaar ! Scheen het in maart, alsof het voorjaar van 1957 uitzonderlijk goed zou worden, april en de beide volgende maanden waren zeer teleurstellend.

Dagvlinders waren slechts heel matig en dan in hoofdzaak nog witjes. Zelfs de zo gewone *pamphilus* zag ik slechts in enkele exemplaren. Ook de lichtvangst was ver beneden normaal, terwijl op smeer heel weinig afkwam. Vanzelfsprekend waren de vliegtijden verre van normaal. Merkwaardig was echter, dat enkele soorten weer uitzonderlijk goed vertegenwoordigd waren. Zo *Hyppa rectilinea* Esp., die ik gewoonlijk slechts in een paar exemplaren zie. Vooral op smeer was de vlinder zelfs op de slechtste avonden nog in aantal aanwezig.

De eerste *gamma*'s zag ik pas op 14 juni, precies een maand later dan in 1956. Van *Apatele rumicis*, anders een vervelende plaag hier, zag ik slechts twee exemplaren. Trouwens van de meest gewone soorten vliegen maar weinig vlinders. Rupsen waren daarentegen dit voorjaar genoeg te vinden!

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.

Mieren en rupsen van *Aglia tau* L. Ik had een paar eieren van *tau* op berk gevonden en kweekte de rupsen buiten op. Op een kwade dag kwam ik tot de ontdekking, dat de prachtige dieren gedood waren door mieren.

Dit is niet de eerste maal, dat deze rupsen een lekkernij voor mieren bleken te zijn. Meerdere keren vond ik *tau*-rupsen op stammen van eik en beuk, welke door mieren aangevallen waren en bijna of reeds geheel gedood waren. Eenmaal leverde een gewonde rups nog een klein ♀ op.

Dat de mieren toevallig net de *tau*-rupsen aanvielen, lijkt me uitgesloten. Vlak er bij stonden rupsen van vijf andere vlindersoorten, waarmee niets gebeurde. Maar de pot met *tau*-rupsen krioelde van de mieren.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.