

- OUDEMANS, A. C., 1937, *Kritisch Historisch Overzicht der Acarologie*. Brill, Leiden. 3c : 1064—1066, f. 495.
- PRITCHARD, A. E. & BAKER, E. W., 1955, A revision of the Spider Mite, Family Tetranychidae. *Mem. Ser., Pac. Coast ent. Soc.* 2.
- RECK, H. F., 1947, "The genus *Bryobia* Koch (Tetranychidae) after material from Georgia". *Soobsch. Akad. Nauk Gruz. S.S.R.* 8 (9—10): 653—660, f. 1—15 (en langue russe).

Amsterdam-O., Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21.

Coleoptera in en om de boerderij

door

A. C. NONNEKENS

Begin juli 1956 ontving ik van de heer HOUTMAN een vangbuisje met miniatuurkevertjes, afkomstig uit boerderijen te Oude Niedorp.

Bij determinatie bleken het alle diertjes te zijn, die behoren tot de schimmel-fauna. Zij leven in of van schimmels. Ik vond er de volgende soorten bij :

Crataraea suturalis Sahlb. Eén exemplaar. Leeft o.a. in stallen en schuren.

Cryptophagus scutellatus Newm. Eén exemplaar. Een zeer zeldzame soort, die in beschimmeld stro voorkomt.

Atomaria munda Ev. Zes exemplaren. Wordt nabij stallen en schuren in beschimmeld stro gevonden.

Holoparamecus singularis Beck. Een groot aantal. Komt in massa voor op hooizolders van boerderijen.

Holoparamecus kunzei Aubé. Was eveneens in aantal aanwezig, doch minder dan *singularis*.

Holoparamecus ragusae Reitter. 24 exemplaren. Deze zeldzame soort is slechts eenmaal in Nederland gevonden te Den Haag op schimmel van wijnvaten. Zie Col. Neerl. III, blz. 242.

Aglemus brunneus Gyll. Een vrij groot aantal. Komt soms in huizen en bakkerijen voor en verder in boerderijen.

Cartodera ruficollis Reitter. Een zeer groot aantal. Deze soort is op vele plaatsen niet zeldzaam.

Cartodera argus Reitter. Eén exemplaar. Daarvoor is deze zeldzame soort slechts gevonden bij Rhoon en bij Pannerden, op beide vindplaatsen eenmaal. Zie Col. Neerl. III, blz. 245.

Laemophloeus ferrugineus Steph. Een zeer groot aantal. Wordt op graanzolders gevonden.

Monotoma bicolor var. *quisquilarius* Redt. Zes exemplaren. Leeft onder beschimmeld hooi.

Typhaea fumata L. Twee exemplaren. Is zeer algemeen tussen beschimmeld hooi in stallen, schuren, enz.

Summary

The writer received a number of small Coleoptera found in farms at Oude Niedorp (prov. of North Holland). They all proved to be species belonging to the mould fauna.

Amstelveen, Amsterdam-Z2, Da Costalaan 48.