

fauna-bewerking natuurlijk terdege voelen, maar de auteurs hebben zich moeizaam en dapper door deze bezwaren heengeslagen door ieder het zijne te geven en aldus aan alle partijen tegemoet te komen. De „oude school” in de nomenclatuur — sterk beïnvloed door de Duitse libellenkenner Er. SCHMIDT — heeft de overhand gekregen, zodat *Agrion* weer *Calopteryx* is geworden en *Coenagrion* in de synonymie van *Agrion* is geplaatst. Dit is zeer jammer, daar het de verwarring bestendigt: de jongere generatie begon er juist aan te gewinnen! P. P. CALVERT heeft voorgesteld de naam *Calopteryx* (voor onze beekjuffers) maar weer in te voeren, *Coenagrion* definitief voor de blauwe juffertjes te accepteren, inplaats van *Agrion*, en laatstgenoemde naam te doen verdwijnen. Een Salomo's oordeel, waaraan naar ik hoop ééns gevolg zal worden gegeven.

Het derde door NIELSEN bewerkte gedeelte is verreweg het belangrijkste hoofdstuk van het boek, daar het vele goede beschrijvingen en uitmuntende originele afbeeldingen der monddelen etc. bevat; samen met A. E. GARDNER's geschriften over de larvenstadiën der Britse Odonata, beschikken wij thans over vrij volledige karakteristieken der Midden-europese libellenlarven.

De weinige bezwaren, die men zou kunnen opperen tegen dit boek, gelden de criteria voor de onderscheiding der rassen en de nomenclatuur, voorgesteld bij de 3 in Italië voorkomende *Agrion* (= *Calopteryx*)-soorten; hier gaat de naamgeverij m.i. te ver. Aanvechtbaar blijft de plaats van *Aeshna isosceles* in het genus *Anaciaeschna*. De overbodige naam *interlineata* Ander, voor de Europese subspecies van de nearctische *Aeshna subarctica* Walker, moet worden vervangen door *elisabethae* Djakonov, zoals door mij is vastgesteld (zie *Tijdschr. Entom.* 72 : 169, 1929 en *Ent. Ber.* 14 : 17, 1952). Weliswaar is deze soort nog niet in N.-Italië aangetroffen, maar het is goed gezien, dat de auteurs alle soorten hebben opgenomen, die een kans maken nog ontdekt te worden. De naam *Mesogomphus* Förster dient vervangen te worden door *Paragomphus* Cowley.

Voor hen, die belangstellen in de mediterrane Odonatenfauna en op de hoogte wensen te komen van het vele, dat in de laatste twintig jaar over de Europese libellen in het algemeen bekend is geworden, is dit een onmisbaar werk, daar ook de literatuur goed is bijgehouden. En wat Italië zelf betreft: nu pas blijkt hoevele ontdekkingen men daar nog kan doen! — M. A. LIEFTINCK.

Hering, E. M., *Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa*. Bd. I Pflanzengattungen, Bd. III Neubeschreibungen. Junk, 's-Gravenhage, 1957.

Van dit standaardwerk zijn thans 2 delen verschenen. Band I behandelt in alfabetische volgorde de plantengeslachten en de daarin voorkomende mijngangen. Het gaat tot *Lytbrum*, kattestaart. De beschrijvingen zijn kort en goed. In de derde Band worden nieuwe soorten beschreven en wordt een systematisch overzicht gegeven van de waardplanten en van de veroorzakers van mijngangen.

De afbeeldingen nemen een groot gedeelte van dit deel in. Ik heb een aantal van mij onbekende mijngangen met de afbeeldingen vergeleken en kon ze dadelijk identificeren. Zoals te verwachten is van iemand met zo'n ervaring als HERING, heeft hij ook de voor de beginner moeilijke gevallen duidelijk aangegeven. Voor allen die zich willen bekwamen in dit veelomvattende gebied een onmisbaar handboek. — W. J. KABOS.

Hadena confusa Hufnagel. Blijkbaar is deze vroeger zo begerenswaardige vlinder lang niet zo'n zeldzaamheid. Sinds 1951 verschijnen beide generaties geregeld en in opgaande aantallen bij mij thuis op licht. Biezonder goed is het in 1957 geweest. Elke lichtavond verschenen vier of vijf exemplaren, mannetjes zowel als wijfjes. Van enige variabiliteit is echter geen spoor te ontdekken. Alleen is de witte band bij het ♂ wat minder breed dan bij het ♀ en is het franjeveld bij sommige exemplaren wat minder bont.

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.