

HEIMS leg. (hierzu Exuvie). Paratypen: 8 ♂ ♂ und 4 ♀ ♀, Griekenland, Kato-Olymp, Kanalon, 800 m, 14/27.VI.1952; 1 ♂, Griekenland, Insel Naxos (Cycladen), 700 m, BUCHHOLZ leg.; 1 ♂, Griekenland, Ossa, 1200 m, 14.VI.1952, MANNHEIMS leg.; 1 ♂, Spanien, s. Madrid, Auwald, Talavera de la Reine, 19.V. 1955, MANNHEIMS leg.

Holotypus und 11 Paratypen im Museum Koenig, Bonn; 4 Paratypen in meiner Sammlung.

Amsterdam-C., Kerkstraat 136.

Möhn, E., Beiträge zur Systematik der Larven der Itonididae (= Cecidomyiidae, Diptera) 1. Teil: Porricondylinae und Itonidinae Mitteleuropas. *Zoologica*, 38. Band, Heft 105, Lief. 1 und 2, Seiten 1—247, mit 362 Figuren auf 30 Tafeln. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1955.

Dit samenvattende werk, dat het proefschrift van de auteur vormt, draagt in niet geringe mate bij tot de kennis van de larvale kenmerken van de galmuggen (Diptera, Itonididae), een gebied, waaraan tot op heden nog maar weinig of geen speciale aandacht is geschonken. Volgens Dr. MÖHN moet zijn werk slechts als een onderdeel van de systematiek der Itonididae worden gezien. Niettemin moet men bewondering hebben voor de moeizame en veelomvattende arbeid, die aan de totstandkoming van dit proefschrift, dat een uitstekende en moderne basis voor verder onderzoek vormt, moet zijn voorafgegaan.

De Itonididae worden hier onderverdeeld in 4 onderfamilies, n.l. Lestremiinae, Heteropeziinae, Porricondylinae en Itonidinae; de larven-onderzoekingen van de beide eerste onderfamilies zijn nog niet afgesloten. In het algemene gedeelte worden de morfologie en de levenswijze van de galmuglarven behandeld, terwijl wenken voor het opkweken en prepareren worden gegeven. Dan volgt het algemeen-systematische gedeelte, waarin het huidige systeem van de Itonididae wordt gecorrigeerd, zonder echter tot een geheel nieuwe indeling over te gaan; in het speciaal-systematische gedeelte zijn geslachts- en soortdiagnosen van de in Midden-Europa voorkomende Porricondylinae en Itonidinae opgenomen.

Met de op pag 230—238 voorkomende tabellen kunnen de larven van de Porricondylinae en Itonidinae tot op het geslacht worden gedetermineerd. De vele duidelijk uitgevoerde afbeeldingen sluiten op zeer verhelderende wijze bij de tabellen en diagnosen aan. Een uitgebreide lijst met literatuurgegevens en een alfabetisch register van geslachts- en soortnamen besluiten dit werk, dat een belangrijke, zo niet onmisbare schakel vormt tot de bestudering van deze zo interessante familie der Diptera. — W. NIJVELDT.

*Euphyia luctuata* Schiff. Vrijdag 10 mei 1957 was ik met de heer OORD in de Mid-dachter bossen en vond daar geheel buiten verwachting twee exemplaren van *luctuata*. Het ene was wat afgevlogen, doch het andere was mooi gaaf. Ik vond ze niet bij elkaar, doch wel op aangrenzend terrein.

H. G. VAN GALEN, Aalten.

Afdelingsvergaderingen. De afdeling Noord-Holland en Utrecht zal dit winterseizoen nog bijeenkomen op 27 november, 29 januari en 5 maart, 's avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam.

De afdeling Zuid-Holland vergadert nog op 18 december en 19 februari in Hotel Terminus te Den Haag, terwijl op een nader te bepalen datum in april een vergadering in het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden gehouden zal worden.

DE AFDELINGSSECRETARISSEN.