

138B

FEB 14 1956

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 16

1 januari 1956

No 1

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: P. A. A. Loof: Een nieuwe vindplaats van *Dicranocephalus medius* M. R. (Hem.-Coreidae) (p. 1). — A. J. Besseling: Nederlandse Hydrachnellae XXXVII (p. 3). — J. B. M. van Dinther: Three noxious Hornworms in Suriname (p. 7). — Tenth International Congress of Entomology (p. 10). — W. Oord: *Endromis versicolora* L. (p. 11). — E. T. G. Elton: Aantasting van moll-platen door de kleine wasmot *Achroia grisella* Fabr. (Lep., Pyralidae) (p. 12). — I. Harpaz: Note on the Occurrence of *Apion flavofemoratum* Hbst., var. *croceifemoratum* Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) in Irsaël (p. 15). — Literatuur (p. 6: W. H. Gravestein; p. 16: J. de Wilde). — Korte mededelingen (p. 2: W. J. Boer Leffel; p. 2, 10: B. J. Lempke; p. 9, 10: K. Tolman; p. 14: Mededeling).

Een nieuwe vindplaats van *Dicranocephalus medius* M. R. (Hem.-Coreidae)

door
P. A. A. LOOF

Tijdens een excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen op 23 mei 1953 werd van wolfsmelk een wants gesleept, die bij determinatie tot mijn grote verrassing een ♀ van bovengenoemde soort bleek te zijn. Dit dier was in 1883 door FOKKER van Arnhem vermeld, en daarna niet meer in ons land waargenomen, tot COBBEN in 1948 de soort in Midden-Limburg aantrof.

Op 5 september zocht ik dit plekje in de duinen nog eens op. Slepen leverde niets op. Toen ik echter op de grond ging liggen en de wolfsmelkplanten uiteen boog, bleek de soort onder de planten, tussen dode stengels en mos, talrijk voor te komen. In een half uur had ik 10 exemplaren verzameld, ongeteld een aantal, die me te vlug af waren geweest. Larven in het 4e en 5e stadium waren eveneens aanwezig. Het gelukte mij helaas niet, de dieren de winter over te houden; het laatste exemplaar stierf begin maart.

De soort blijkt dus niet tot de oostelijke provincies beperkt te zijn. Of ze in het tussenliggend gebied voorkomt, is onzeker, maar zeer goed mogelijk. Daar ze echter meer onder dan op wolfsmelk voorkomt, zal ze door slepen meestal niet te vangen zijn, behalve op zeer warme dagen. Dit is misschien een reden, dat ze nog maar weinig in ons land is gevonden. Met dit voor ogen heb ik op 1 juni



Mej. A. MASTEBROEK del.
Dicranocephalus medius
M.R. ♂

1955 de dicht met *Euphorbia esula* begroeide spoordijk tussen Heilo en Alkmaar afgezocht, maar kon de soort niet vinden, ondanks enkele uren speuren.

In ons land is de verspreiding van deze soort merkwaardig parallel aan die van de verwante *D. agilis* Scop.

D. medius: Vlodrop, Arnhem, Vogelenzang.

D. agilis: Vlodrop, en een (helaas oncontroleerbare) oude opgave van Den Haag. Dit is opvallend, omdat in Engeland deze soorten bijna nooit samen voorkomen. Zo schrijft THOMAS, dat in Devon en Cornwall *D. medius* alleen in het binnenland voorkomt, op grazige, met wolfsmelk begroeide plaatsen aan de zonkant van bossen, terwijl *D. agilis* alleen in de duinen voorkomt. Evenzo geeft DICKER aan, dat *D. medius* verbreid is in de bosrijke streken van Midden-Kent. Waarop dit verschil berust, is mij niet bekend.

D. medius is een levendig en vlug dier. De geur is aangenaam en doet aan rijpe peren denken.

Het is in ieder geval de moeite waard, langs de grote rivieren eens naar dit dier uit te zien.

Literatuur

COBBEN, R. H., 1948, Vier wantsensoorten, nieuw voor de Nederlandse fauna, *Natuurbist. Maandbl. Maastricht* 37: 50—51.

DICKER, G. H. L., 1945, Notes on British Coreids, *Ent. Mo. Mag.* 81: 278—279.

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S. C., 1878, Hemiptera Heteroptera Neerlandica. Den Haag.

THOMAS, D. C., 1955, Notes on the biology of some Hemiptera Heteroptera II: Coreoidea, *Entomologist* 88: 33—36.

Summary

Dicranocephalus medius M.R., a Coreid hitherto recorded only from the Eastern provinces of Holland, has now been found on the sand dunes near Haarlem.

Wageningen, Borneostraat 22.

✓ Rups van *Apatura iris* L. Het merkwaardigste, dat ik sinds 1951 beleefde, was, dat op de wilg, die ik begin juni 1955 als voer voor mijn rupsen plukte op niet meer dan 250 m van mijn woning, een pracht halfwas rups van *Apatura iris* zat! Later vond ik er nog een tweede exemplaar. Ergo, de soort zit ook te Apeldoorn. Deze gemeente begint zo langzamerhand een waardige pendant van Swalmen etc. te worden!

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.

✓ Een mooie *Deilinea pusaria* L. Op 28 mei 1954 ving de heer W. H. SOUTENDIJK te Hoenderlo een prachtig ♂ van *Deilinea pusaria* L., f. *crassesignata* Lempke. De vorm is ongetwijfeld zeer schaars, daar mij behalve het hier vermelde en afgebeelde exemplaar alleen het in de Catalogus beschreven dier bekend is. Wel heb ik in de collecties een paar exemplaren gezien, waarbij alleen de middelste lijn verdikt is. — LPK.

