

38B

ENTOMOLOGISCHE BERICHTTEN

LIBRARY SERIAL RECORD
APR 26 1956

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 16

1 april 1956

No 4

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: G. L. van Eyndhoven: Verslag van de 110e Zomerbijeenkomst (p. 53). — J. J. Meurer: Waarnemingen van Wantsen (Hem.-Het.) met behulp van een vanglamp (p. 54). — B. H. H. Bergman: On three Jassidae of *Arachis hypogaea* in Java (p. 65). — B. J. Lempke: Vlindertrek (p. 71). — Korte mededelingen (p. 53, 72: W. J. Boer Leffef; p. 63: W. Oord; p. 72: K. Alders).

✓ Verslag van de 110e Zomerbijeenkomst

door

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris

De 110e Zomerbijeenkomst der Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 juni 1955 in Hotel „De Zwaan” te Delden.

Aanwezig waren omstreeks 25 leden. De bijeenkomst was vrijwel geheel gewijd aan de excursies. Helaas werkte het weer niet mede, zodat vele leden slechts geringe resultaten konden boeken. Anderen, zoals de coleopterologen en schrijver dezes in zijn kwaliteit van acaroloog kunnen echter wel op goede vangsten terugzien.

Tijdens een korte vergadering werd ons overleden lid H. COLDEWEY herdacht. Voorts werd besloten dat de plaats waar de volgende zomerbijeenkomst zal worden gehouden, op de daaraan voorafgaande zomerbijeenkomst zal worden bepaald.

Als plaats voor de 111e zomerbijeenkomst wordt gekozen Zuid-Limburg en wel zo mogelijk Vaals. Echter wordt ernstig overwogen om ook eens naar een der Waddeneilanden te gaan.

Op deze plaats nogmaals een woord van hartelijke dank aan de eigenaresse van het landgoed „Twickel”, die ons toestond ook te verzamelen op de terreinen, welke anders niet voor het publiek opengesteld zijn.

Endromis versicolora L. In aanvulling op het artikel in *Ent. Ber.* 16: 11, 1956, over deze soort het volgende: Mijn ervaring, over verscheidene jaren lopend, is, dat de ♀♀ laag vliëgend eieren afzetten over grote afstand, zeer verspreid en meest op armoedige en lage struiken, in groepjes variërend van 6 tot 15 stuks. Zo vond ik bijv. op een ± 60 cm hoog, armelijk berkestruikje 6 volwassen rupsen, er waren nog welgeteld elf blaadjes over!

De ♂♂ komen hier geregeld op licht, gewoon is de soort echter de laatste jaren niet meer, het blijft een zeldzaam dier, ook op de vliegplaatsen!

W. J. BOER LEFFEF, Korteweg 53, Apeldoorn.