

Korte mededelingen

✓ *Cinxia borealis* Fall. (Dipt.) In aansluiting op het artikel van de heer VAN DER GOOT (*Ent. Ber.* 15 : 483, onder no. 93) kan ik nog als vindplaatsen van deze zweefvlieg opgeven Nuenen en Eindhoven, beide op 5.VIII.1951. De gevangen exemplaren zijn ♂ ♂.

G. VAN DER ZANDEN, N. Brabantlaan 21, Eindhoven.

✓ **Bijzondere vlindervangsten in 1955.** Dit jaar heb ik weinig goede vormen gevangen. Deze wil ik hieronder vermelden.

Pieris napi L., f. *marginestixis* Dannehl. Een mooi ♂, a.o., Amsterdam, 2.IV. Een interessante vangst was een ♂, dat op de rechter voorvleugel bij de onderrand de vrouwelijke wigvormige zwarte streep heeft. Volgens de Heer LEMPKE is dit misschien een partiële gynandromorf.

Fabriciana charlotta Hw. (*aglaja* L.). Van deze soort ving ik hier in Amsterdam op 1 augustus een verdwaalde ♂.

Lycaena phlaeas L., f. *schmidtii* Gerhard. Dit exemplaar is zuiver wit. Bovendien is de linker onder vleugel verbleekt. Amsterdam, ♂, 12.VIII.

F. obsoleta Tutt. Mooi ♀ met weinig rood op de achtervleugels. Amsterdam, 11.VIII.

Coenonympha pamphilus L., f. *caeca* Obthr. Een ♂, Amsterdam, 16.VIII.

Lasiommata megera L., f. *limbojuncta* Stammeshaus. In de collectie van de Heer J. P. KAZENBROOT te Schiedam zag ik een tweede exemplaar van deze vorm, ook een ♀. Schiedam, 8.VIII.1953.

H. J. L. T. STAMMESHaus, Grensstraat 15, Amsterdam-O.

✓ *Melitaea didyma* Esper. Nauwelijks was het derde supplement van de *Catalogus* verschenen met mijn ietwat pessimistische beschouwing over de vangst van deze vlinder in 1935 te Baarlo, of ik kreeg de publicatie van ZIELASKOWSKI, *Die Groszschmetterlinge des Ruhrgebietes*, in handen. Zij was al in 1951 verschenen, maar ik had er niet eerder een aankondiging van gezien. Hierin staat op p. 11: „Fust entdeckte diese, für unsere Fauna ganz neue Art am 13.7.30 bei Kirchhellen und konnte durch weitere Funde am 28.6.31 sowie in den Jahren 34 und 37 ihre Bodenständigkeit nachweisen”.

In dezelfde tijd, dat bij Baarlo twee exemplaren gevangen werden, vloog de soort dus ook in het Roergebied. Nu is de afstand van Baarlo naar dit gebied nog zeer behoorlijk, maar beide vindplaatsen liggen in elk geval op dezelfde geografische breedte en dat maakt de vangst te Baarlo van twee exemplaren, die ongetwijfeld als uiterste noordwestelijke voorposten beschouwd moeten worden, dus veel aannemelijker. Ik zou de vierkante haakjes dan ook maar laten vervallen, al blijft het kleine lettertype volkomen verantwoord. Hieruit blijkt overigens weer, dat iemand, die faunistisch werk publiceert, altijd moet zorgen zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van wat er bij zijn bureu gebeurt.

Nog iets over het boekje zelf. Het telt 128 bladzijden, kost DM 4.50 en moet besteld worden bij het Ruhrlandmuseum, Essen I, Bismarckstrasse 62. Het aantal vastgestelde soorten bedraagt 78 dagvlinders, 148 soorten uit Seitz 2, 288 uilen en 255 spanners, samen dus 769, zeker niet gek voor zo'n klein gebied, dat bovendien sterk geïndustrialiseerd is.

Bij bijna elke soort worden alle vormen vermeld, die er in Seitz bij genoemd zijn, met zo mogelijk nog kortere diagnose. Slechts een heel klein deel ervan is uit het Roergebied bekend. Ook een zeer groot deel van de biologische gegevens, zoals de voedselplanten van de rupsen, is eenvoudig uit de paar geraadpleegde handboeken overgenomen. Toch is het wel een interessant boekje, maar dan in hoofdzaak om de verbreiding van de behandelde soorten te leren kennen.

Op hetzelfde adres is ook te krijgen GRABE, *Die Kleinschmetterlinge des Ruhrgebietes*, 159 blz., DM 5.—, dat ik nog niet gezien heb. — LPK.