

***Appias* en *Delias* uit Indonesië (Lep.)**

door

W. K. J. ROEPKE

Op de 85e Wintervergadering van 15 Maart 1953 demonstreerde ik een vrouwelijk exemplaar van *Appias libythea* F. uit N.O. Sumatra. Deze Pieride is alleen bekend van Continentaal Azië en de Philippijnen, verscheen echter kort geleden, volgens een correspondent, in vrij groten getale op de N.O. kust van Sumatra. Het geldt waarschijnlijk een trekker, die naar Sumatra is overgevlogen en zich hier misschien staande zal houden. In elk geval is het een nieuwe aanwinst voor de dagvlinderfauna van de Maleise archipel.

Voorts demonstreerde ik 2 exemplaren van het geslacht *Delias*, die mij kort geleden door een correspondent van het eiland Flores werden toegezonden. De ene soort, een zeer fraai dier, is van het eiland bekend als *D. sambawana everetti* Roths. Deze soort met haar subspecies is alleen van de eilanden Lombok, Soembawa en Flores bekend. De tweede soort is een subspecies van de op Java algemene *D. periboea* Gdt. Zij is tot nog toe niet van Flores bekend, maar wel van Lombok en Soemba-Soembawa. Het meest komt zij overeen met de subspecies *livia* Fruhs. van Lombok, maar zij onderscheidt zich hiervan doordat de discus van de reeks der rode randvlekken op de achtervleugelonderzijde volledig is. Wij hebben hier klaarblijkelijk met een nieuwe subspecies te doen, die een naam verdient: *floresiana* n. subsp. Het type bevindt zich in mijn collectie: 1 ♂, midden Flores.

De afbeelding van *D. periboea livia* Fruhs. in Seitz 9, 1910, Pl. 56d, onderzijde, geeft een ♀ weer, en niet een ♂, zoals abusievelijk op de plaat is vermeld.

*Summary*

Discussion of *Appias libythea*, *Delias sambawana everetti* and the new subspecies *Delias periboea floresiana*. The diagnosis of the latter is: Near *D. p. livia* Fruhs. from Lombok, but the red marginal patches on hindwing underside larger and complete. Discus of forewing underside white, without broad black streaks along the veins.

Wageningen, Diedenweg 12, Maart 1953.

***Acyphoderes hirtipes* uit Surinaams hout (Col.)**

door

W. K. J. ROEPKE

In het voorjaar van 1952 ontving ik van het Instituut voor Technische Botanie te Delft een monster Surinaams hout, aangetast door insecten. Gevraagd werd, wat dit voor insecten waren. Uit dit materiaal, dat in een zeer warm vertrek werd bewaard, zijn 4 exemplaren van een aardige boktor te voorschijn gekomen, die ik hier niet op naam kon brengen. Tijdens een bezoek aan het British Museum (N.H.) te Londen kon het insect worden gedetermineerd als *Acyphoderes hirtipes* Kl. 1825. Volgens de Cat. Col. is dit insect alleen uit Brazilië bekend; het behoort tot de subfam. Cerambycinae, groep Rhinotragini. De houtsoort in kwestie