

heet botanisch *Vatairea guyanensis* Aubl. Dit geslacht is nauw verwant aan het Indische geslacht *Pterocarpus*.

Summary

Acyphoderes hirtipes has developed in the Netherlands in timber coming from Surinam.

Wageningen, Diedenweg 12, Maart 1953.

Zeldzame en nieuwe Lepidoptera

door

G. S. A. VAN DER MEULEN

Op de 85e Wintervergadering van 15 Maart 1953 heb ik de volgende zeldzame en nieuwe vlinders laten rondgaan:

1°. Een nieuwe Agrotide voor de Nederlandse fauna, n.l. *Rhyacia lucipeta* Schiff., waarvan in Ent. Ber. 14: 224 (1953) reeds melding is gemaakt.

2e. Drie prachtige exemplaren van *Scopula marginepunctata* Goeze, gevangen op de Sint Pietersberg. Deze zijn nogal donker met geelachtige tint.

3e Een teratologisch exemplaar van *Thera variata* Schiff., gevangen op een boomstam bij de Lage Vuursche. Bij dit dier is de linker voorvleugel slechts gedeeltelijk aanwezig, hoewel het overigens een zeer gaaf exemplaar is.

4e. Enige exemplaren van een kweek van *Nycterosea obstipata* F., de soort, die in de lijst der trekvlinderwaarnemingen voorkomt. Een ♀ werd 13 Augustus 1952 op de Sint Pietersberg gevangen en zette daarna eieren af. De heer LEMPKE wijst er in zijn Catalogus al op, dat de ontwikkeling bij kweken onder gunstige omstandigheden snel verloopt. Dit klopt met het verloop van deze kweek, hoewel de omstandigheden nu niet bepaald gunstig genoemd kunnen worden, nl. een koude tweede helft van September 1952.

De kweek verliep als volgt: 13 Augustus vlinder gevangen; 13—16 Augustus eieren verkregen; 17—18 Augustus kwamen reeds de rupsjes te voorschijn; 1 September waren de rupsen door de laatste vervelling heen; 5 September enige ingesponnen; 1e vlinder op 3 October. De ontwikkeling van vlinder tot vlinder van de volgende generatie duurde dus 51 dagen.

Volgens Catalogus-LEMPKE is *obstipata* een zeldzame immigrant uit Zuid-Europa en was 1932 met 12 gevangen exemplaren het beste jaar.

5e. Een exemplaar *Xanthorhoë spadicearia* Schiff., gevangen te Hooghalen. Dit dier vertoont een opmerkelijke afwijking in tekening. Het middenveld der voorvleugels is sterk versmald, analoog aan *X. ferrugata*, f. *coarctata* Prout, terwijl de overige tekening zeer onduidelijk of afwezig is. Deze vorm is nog niet in Catalogus-LEMPKE vermeld.

Summary

The author enumerates various species of Lepidoptera, captured by him, which are rare or new for the Netherlands fauna.

Amsterdam, Van Breestraat 170, Maart 1953.