

den is groot en een voortgezet onderzoek naar de fauna van gastheren en parasieten zal zeer zeker de moeite waard zijn.

Naschrift

Na afsluiting van het manuscript van dit artikel ontving ik van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen een zending vlooiën ter determinatie. Hierbij bevonden zich van Terschelling: 1 ♀ *Ctenophthalmus agyrtes agyrtes* (Heller), *Apodemus sylvaticus*, 1.IX.1952; 1 ♀ *Doratopsylla dasyncnemus dasyncnemus* (Rothschild) en 1 ♀ *Palaeopsylla soricis soricis* (Dale), *Sorex araneus*, 1.IX.1952. Dit materiaal komt dus geheel overeen met het door mij verzamelde. De P.D.-zending bevatte voorts de eerste verzamelde vlo van Texel (Muy): 1 ♂ *Ctenophthalmus agyrtes agyrtes* (Heller), door de Heer H. DE VRIES op 14.IV.1952 gevangen uit de pels van een gastheer, waarvan in Nederland nog geen vlooiën verzameld waren, nl. *Microtus oeconomus*, de enige op Texel voorkomende woelmuis.

Literatuur

- MAC GILLAVRY, D., 1914, De entomologische fauna van het eiland Terschelling voor zoover zij tot nu toe bekend is. *Tijdschr. Ent.* 57: 89—106.
 SCHREUDER, A., 1945, Verspreiding en voorgeschiedenis der niet algemeene Nederlandsche muizen. *Zool. Meded.*, 25: 239—284.
 STRUVE, R., 1939, Ein Beitrag zur Puliciden-Fauna der Nordseeinsel Borkum. *Abb. Nat. Ver. Bremen*, 31: 551—553.

Summary

Eight species of mammal-fleas are recorded above from the West Frisian island of Terschelling; some 40 nests of the herring-gull were examined for fleas and flea-larvae, with a negative result. Five days collecting on another W. Frisian island, Schiermonnikoog, yielded only one pair of *Ctenophthalmus agyrtes agyrtes*; this subspecies is also recorded here from the W. Frisian island of Texel.

British Museum (Natural History),

The Zoological Museum, Tring, Herts. November 1953.

Nomenclatuur der Nederlandse Microlepidoptera 2. In een wel-gedocumenteerd artikel, getiteld „Classification of holarctic species of the genus *Lobesia* Guenée, with description of *Paralobesia* gen. nov. (Lepidoptera, Tortricidae)”, in ons *Tijdschrift voor Entomologie*, 96: 85—94, figs. 1—5, van 15 September 1953, geeft Dr N. S. OBRAZTSOV een nauwkeurige analyse van deze groep van de subfamilie Olethreutinae. Het geslacht *Polychrosis* Ragonot, 1894, blijkt niet houdbaar te zijn en wordt gedegradeerd tot een subgenus van *Lobesia* Guenée, 1845. De volgende naamsveranderingen worden thans voor onze faunalijs van kracht (de nummers zijn van de STAUDINGER en REBEL-Catalogus):

1951. „*Polychrosis artemisiana* Z.” wordt *Lobesia* (*Lobesia*) *artemisiana* (Zeller, 1847).
 1955. „*Polychrosis fuligana* Hw.” wordt *Lobesia* (*Lobesia*) *fuligana* (Haworth, 1811).
 1956. „*Polychrosis littoralis* Curt.” wordt *Lobesia* (*Lobesia*) *littoralis* (Westwood, 1845).
 De naam *littoralis* van CURTIS, 1831 (*Cnephasia*), is een nomen nudum.
 1963. „*Lobesia permixtana* Hb.” wordt *Lobesia* (*Lobesia*) *reliquana* (Hübner, 1825), nec Schiffermiller, 1776. De naam *permixtana* van Hübner, [1796—1799], is niet in een binominale combinatie gebruikt en derhalve niet geldig.

A. DIAKONOFF, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.