

18. *Mythimna albipuncta* F. 178 observations north of the large rivers, a rather good number.
19. *Mythimna l. album* L. 111 observations, no doubt a good figure.
20. *Mythimna vitellina* Hb. One specimen in Dutch Limburg.
21. *Heliothis scutosa* Schiff. One specimen in June.
22. *Hoplodrina ambigua* Schiff. 118 observations, a rather good figure.
23. *Catocala fraxini* L. Two specimens.
24. *Plusia gamma* L. At first moderate, but already in July in good numbers. High numbers in the beginning of September, possibly due to new immigrations. Total number 121,488, the highest figure ever reached.

On September 1st a specimen was taken at Wageningen (Gelderland) marked with a green horizontal line on the left fore wing. It was certainly not marked in Holland, but very probably in Germany, as this country uses green for marking purposes. It has however not yet been possible to discover the origin of the moth.

25. *Plusia confusa* Stephens. 27 specimens, again a top figure !

26. *Nycterosea obstipata* F. Two specimens in September.

The report shows that the total result of the season is not at all so bad as might be expected from the pessimistic notes in the periodicals.

It is suggested to mark in Holland only with an orange colour to start with 1955.

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12III, Juni 1954.

---

**Aanlokken of afweer bij Witjes ?** Miss V. TEMPLE publiceerde in de *Ent. Gazette* 4: 141—161 (1953) „Some notes on the courtship of Butterflies in Britain”, een artikel met talrijke interessante opmerkingen. Reeds enige malen is in de *Ent. Ber.* geschreven over het gedrag van het *Pieris*-♀, dat met uitgespreide vleugels en hoog opgericht abdomen gaat zitten, wanneer een ♂ om haar heen fladdert (zie *Ent. Ber.* 13 : 20, 111, 253). Mijn indruk was, dat dit afweer betekende. Miss TEMPLE komt tot dezelfde gevolgtrekking. Zij schrijft (l. c., p. 156):

“Should a female appear he will pursue her and execute with her a tumbling love-flight until she settles. Then, sometimes, she will tilt her abdomen so that it is nearly at right-angles to the plane of her outstretched wings; this attitude apparently being one of defence against the advances of the male and indicating probably, that she has already paired. Should the male continue to flutter about her she will drop to the ground and close her wings, appearing as a pale leaf-shape among the surrounding foliage. This apparently baulks the male, which flies away”.

Ook over de hofmakerij bij andere dagvlindersoorten bevat het artikel veel belangwekkends met aardige illustraties. — LPK.

**Oporinia autumnata** Bkh. Van de heer R. KNOOP te Almelo mocht ik 17 exemplaren van deze soort ontvangen, afkomstig van Zenderen, 25.IX.1953.

KNOOP schrijft mij o.a. „Alle exemplaren zaten aan witte paaltjes langs een rijwielpad. Als ik alles had willen meenemen, zou ik een zending van tussen de 100 en 200 vlinders hebben gehad ! Aan dat fietspad groeide veel els. Daar, waar die boomsoort ontbrak, ontbraken de vlinders ook vrijwel. Er zaten soms 10 tot 12 stuks aan één paaltje.”

G. S. A. VAN DER MEULEN, van Breestraat 170, Amsterdam-Z. 1.

**Dringend te koop gezocht :** Tijdschrift voor Entomologie, deel 55—62, 64 en 68,

A. ASHER & Co, Herengracht 386, Amsterdam-C.