

toeval is, dat deze eerste twee vondsten beide bij Winterswijk zijn gedaan en dan op terreinen, die een aantal kilometers uit elkaar liggen, weet ik niet. In elk geval zal het bij excursies in rietvegetaties goed zijn om duchtig op deze soort te letten.

Een goede afbeelding van de misvorming vindt men in *Ent. Ber.* 14 : 283, 1.VI.1953.

Mogelijk ook is de gal wel eens verward met die van *Therismoptes (Tarsoneumus) phragmitidis* Schlichtd., zoals deze door Han ALTA is afgebeeld in ALTA & DOCTERS VAN LEEUWEN, Gallenboek, 1946, No. 439, p. 171.

Summary

A second locality is mentioned for the gall midge *Giraudiella incurvans* Nijveldt, viz. the "Korenburgerveen", N.W. of Winterswijk, in the Dutch province of Guelderland.

Haarlem, Floraplein 9, Februari 1954.

Merkwaardige overwintering van Lepidoptera. Op 8 April bezocht ik om chiropterologische redenen de kazematten van de linie door de Haarlemmermeerpolder, daartoe welwillend door de autoriteiten in staat gesteld. De chiropterologische resultaten waren nihil, doch ik deed een interessante lepidopterologische waarneming.

Deze kazematten hebben een schemerig voorportaal en een daarachter liggende vrijwel donkere kamer, geheel van beton. Die kamers zijn ca 3 x 3 m groot; zij zijn niet meer in gebruik.

De 3 meest gebruikelijke vlinders werden overwinterend aangetroffen: Roesje (*Scoliopteryx libatrix* L.), die in grotten, forten en ondergrondse gangen wel de algemeenste is, Dagpauwoog (*Nymphalis io* L.) en Kleine Vos (*Aglais urticae* L.), die alle solitair plegen te overwinteren.

In een der donkere kamers echter, midden tegen het betonnen plafond (dus niet in een hoek), zaten op een oppervlak van ca 5 x 5 cm zes vlinders, nl. vijf *Scoliopteryx libatrix* en één *Nymphalis io*. Twee exemplaren van *Scoliopteryx* zaten zelfs gedeeltelijk over elkaar heen.

Deze waarneming komt mooi overeen met die van R. F. AITKEN (*Ent. Gaz.* 5 No. 1, Jan. 1954, Plate 1), die in Engeland (Langhurst, Sussex) 6 stuks *Scoliopteryx* vlak bij elkaar waarnam, die elkaar gedeeltelijk dakpansgewijze overdekten. Dit was in een schuilkamer met betonnen plafond, dus analoog aan de verblijfplaats van mijn dieren. Ook AITKEN nam *Scoliopteryx* tot dusverre slechts solitair waar.

Het aardige van mijn waarneming is vooral, dat hier twee vlindersoorten gemengd bij elkaar zaten. Deze weinige vierkante centimeters van het plafond moeten dus bijzonder aantrekkelijke condities voor overwintering bieden aan vlinders van systematisch ver verwijderde families. Naar de exacte feiten kan men slechts gissen; vermoedelijk spelen luchtstromingen een rol.

(The observation is discussed of 5 *Scol. libatrix* and 1 *Nymph.*, *io* hibernating together on a space of abt. 5 x 5 cm in an empty casemate).

G. L. VAN EYNDHOVEN, Floraplein 9, Haarlem.

Lievensheersbeestjes en hun prooi. Op een excursie deed ik in een buis, waarin zich een spanrups bevond, ook een paar lievensheersbeestjes. Toen ik thuis kwam, was van de rups nog slechts de huid over!

W. J. BOER LEFFER, Korteweg 53, Apeldoorn.