

e. Enige exemplaren van *Cymolomia bartigiana* Rtz. in Juli en Augustus 1953 te Amerongen en Meerssen gevangen ; de soort is nog steeds zeer sporadisch in Nederland waargenomen.

f. Enige exemplaren van *Steganoptycha diniana* Gn. in Augustus 1953 te Amerongen en Zeist gevangen. Deze soort ontdekte ik reeds jaren geleden in één exemplaar te Amerongen ; toenmaals nieuw voor onze fauna (*Tschr. Ent.* 77 : XXIII-XXIV.).

g. Twee exemplaren van *Sphaeroeca obscurana* Sph., op 20 Mei 1953 te Amerongen gevangen ; een soort slechts sporadisch in ons land waargenomen.

h. Een exemplaar van *Eidophasia messingiella* F.R. op 27 Juni 1953 te Amerongen gevangen.

i. Een exemplaar van *Phylloporia bistrigella* Hw. op 20 Mei 1953 te Amerongen gevangen ; een nog steeds weinig waargenomen soort.

j. De drie volgende species : *Coleophora fuscedinella* Z., *binderella* Koll. en *bicolorella* Stt., aldus genoemd volgens de oude indeling, gelijken zeer op elkaar ; de beide eerste hebben dezelfde koker, terwijl de imagines respect. zeer donker bruin en lichter bruin zijn. De 2e en 3e zijn geheel gelijk van kleur, lichter bruin, maar de kokertjes verschillen aanmerkelijk.

Volgens later genitaliën-onderzoek blijken de twee eerste één en dezelfde soort te zijn ; de derde is een aparte soort. Volgens MEYRICK, PIERCE, BENANDER en HERING, wordt de nieuwe indeling als volgt: De beide eerste zijn : *Col. fuscedinella* Z., de derde krijgt de naam van de tweede : *Col. binderella* Koll., terwijl *bicolorella* Stt. volgens prioriteitsrecht als synoniem vervalt. Aangezien de tweede een constante variëteit is van de eerste en als imago bijna niet van de derde te onderscheiden is, meen ik goed te doen deze een naam te geven : *Col. fuscedinella* Z. **ab. subnigra** nov. **ab.** (Zie ook *Tschr. Ent.* 94 : 336).

Summary

Faunistic notes about Macro- and Microlepidoptera, new or rare for the Netherlands fauna.

Kasteel Amerongen, Februari 1954.

Macrolepidoptera in 1953

door

T. H. VAN WISSELINGH

Als geheel moet het jaar 1953 als een zeer slecht jaar worden beschouwd. Het voorjaar en de voorzomer waren koud en het aantal soorten dat gemiddeld per avond op de lamp kwam bleef belangrijk lager dan in vorige jaren. In de tweede helft van Juli en in Augustus kwamen enige goede avonden voor. Zo kwamen bv. op 12, 17 en 21 Juli achtereenvolgens 82, 98 en 117 soorten op de lamp, op 12 Augustus 105. September en October gaven mooi weer en een vrij groot aantal voor de lichtvangst geschikte avonden. Toch bleef ook in deze periode de vangst gering. Vele in die tijd anders gewone soorten verschenen slechts in gering aantal, andere zelfs in het geheel niet.

Toch werden in 1953 nog een aantal zeer goede vangsten gedaan, waarvan de voornaamste hier worden vermeld.

Zeldzame soorten :

Hoplodrina ambigua Schiff. op 19 Juli 1953 op licht te Aerdenhout. Volgens de catalogus LEMPKE werd het eerste exemplaar van deze soort in ons land gevangen in 1946 in Limburg door G. S. A. VAN DER MEULEN. Bij het doorzien van mijn collectie vond ik een exemplaar van deze soort, door mij gevangen op 30 Augustus 1945 te Wassenaar.

Epirrhoë tristata L. vloog op 17 Juli 1953 vrij talrijk op een licht bebost heideveldje op de Hoge Veluwe. De op die dag gevangen exemplaren zijn veel zwarter dan de op de bekende vangplaats bij Norg gevangen dieren ; zij zijn vrijwel gelijk aan exemplaren, welke ik in België in het Hohe Venn aantrof.

Pontia daplidice L. Toen ik op 3 Augustus 1953 op dienstreis was in het Botgat bij Groote Keeten (N.H.) zag ik deze soort in aantal vliegen. Op 8 Augustus ben ik er weer heengegaan en ving toen een aantal exemplaren, waarvan het merendeel echter reeds was afgevlogen of beschadigd.

Rhyacia lucipeta Schiff. Deze in 1952 als nieuw voor onze fauna ontdekte soort (VAN DER MEULEN ving een exemplaar op 24 Augustus bij Maastricht en ik op 15 September te Epen) kwam op 6 September op de lamp te Epen (L.).

Asphalia diluta F. was tussen 5 en 20 September 1953 een gewone verschijning op de lamp te Epen, in totaal kwamen er 20 exemplaren op de lamp.

Cryphia muralis F. ving ik op 19 Augustus op de lamp te Aerdenhout.

Cryphia algae F. verscheen op 8 September op de lamp te Epen.

Atethmia xerampelina Esp. op 7 en op 19 September 1953 op de lamp te Epen.

Plusia confusa Stephens, één exemplaar op de lamp te Epen op 8 September 1953.

Chloroclysta miata L. Van deze nog slechts enige malen in Nederland gevonden fraaie spanner kwam op 20 September 1953 een exemplaar op de lamp te Epen.

Cucullia absinthii L. Na op vele plaatsen in Zuid-Limburg Artemisia te hebben afgeklopt, vond ik midden September tussen Wylre en Eys zes rupsen van deze soort.

Afwijkingen :

Actebia praecox L. Op 13 Juli 1953 verscheen een exemplaar met blauwe inplaats van groene grondkleur (f. *praiceps* Hb.).

Afwijkende vangdata :

Heliophobus albicolon Hb. Niettegenstaande het koude voorjaar verscheen het eerste exemplaar van deze soort reeds op 30 April 1953, een tweede op 13 Mei. De vliegtijd is volgens cat. LEMPKE van 11 Mei tot 22 Juli.

Cryphia muralis F. Op 19 Augustus 1953 te Aerdenhout (volkomen fris). Volgens Cat. LEMPKE 21 Juni—15 Augustus.

Cryphia algae F. Op 8 September 1953 te Epen (volkomen fris). Volgens Cat. LEMPKE 5 Juli—25 Augustus.

Pseudoips bicolorana Fueszly. Op 17 Augustus 1953 een vers exemplaar op de lamp te Aerdenhout (Cat. LEMPKE 20 Juni—12 Augustus).

Van de soorten, welke in ons land niet steeds een tweede (of derde) generatie vormen, nam ik deze waar van :

Laotboe populi L. 20 Augustus Aerdenhout.

Deilephila elpenor L. 17 Augustus Aerdenhout.

Deilephila porcellus L. Augustus meerdere Aerdenhout.

Plagodis dolobraria L. 12 Augustus Aerdenhout een pas uit de pop gekomen exemplaar. Van deze soort was een tweede generatie niet bekend.

Jaspidia pygarga Hufn. (*fasciana* L.) op 9 October 1953 te Aerdenhout een fris exemplaar.

Phragmatobia fuliginosa L. Op 12 September 1953 een nog fris exemplaar te Epen, dat vermoedelijk wel tot de derde generatie zal behoren.

Calothysanis amataria L. (*amata* L.) leverde in 1953 een derde generatie. Ik nam deze waar op 14, 15, 25 en 26 September te Epen.

Xanthorhoë spadicearia Schiff. Een exemplaar van de derde generatie op 14 September 1953 te Epen.

Summary

Details about various Macrolepidoptera of the Netherlands fauna, mostly with regard to rare species, special dates of capture, and additional generations.

Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22, Februari 1954.

Euaresta guttata (Fall.) faun. nov. sp. (Trypetidae)

door

W. J. KABOS

Gedurende de Pinksterdagen van 1953 maakte ik een tocht door Z. Limburg. Op een mooie kalkweide bij Schin op Geul ving ik met het sleepnet een aantal boorvliegen, die ik hield voor de zeldzame *Ditricha guttularis* (Mg.), waarvan de larve in de wortels van duizendblad (*Achillea*) leeft. Later ontdekte ik dat enkele exemplaren een afwijkend vleugelpatroon hadden en bij determinatie bleek, dat ik te doen had met **Euaresta guttata (Fall.)**. Deze soort leeft als larve in de bloemhoofdjes van Havikskruid, Margriet, Kamille en Kale Jonker. Het vleugelpatroon lijkt wel op dat van *Ditricha*, maar de druppelvlekken zijn groter en steken meer af. De soort is bekend uit N., Centraal- en Z.-Europa.

Summary

Euaresta guttata (Fall.) has been found new for the Netherlands fauna. Its larvae live in the heads of some Compositae.

Amsterdam, Van Baerlestraat 26I.

Te koop aangeboden. Uit de nalatenschap van de heer VAN ELDIK worden een aantal boeken te koop aangeboden, waaronder Seitz, Voet, Spuler, Brauer, Reitter en andere werken. Lijst aan te vragen bij Mevr. D. VAN ELDIK-SLIERENDRECHT, van der Woertstraat 20, Den Haag.

Gevraagd: Catal. Nederl. Macrolep., deel 2, 3, 4 en 5, of *Tijdschr. Entom.*, deel 80, 81, 82 en 83. Aanbiedingen aan :

W. H. SOUTENDIJK, Burg. Tutein Noltheniuslaan 41, Apeldoorn.