

Sterba humiliata Hufn. Van deze soort, welke in de duinen gewoon is, maar in Limburg slechts een enkele maal werd aangetroffen, verscheen op 1 Augustus een exemplaar. Deze datum valt later dan de gewone vliegtijd. Het is bovendien belangrijk groter dan de in de duinen vliegende dieren.

Perizoma bifasciata Hw. 27 Augustus één exemplaar.

Selenia lunaria Schiff. Twee exemplaren op 3 en 8 Augustus. Beide behoren tot f. *roseofasciata* Lempke. Zij zijn niet kleiner dan de voorjaarsvorm, de achtervleugels zijn niet minder gehakkeld en de maan op de voorvleugels is duidelijk (Vgl. Cat. Ned. Macrolep., X, p. (783)).

Ook over enige minder zeldzame soorten valt nog een en ander op te merken.

Gluphisia crenata Esp. De soort verscheen tussen 21 Juli en 10 Augustus vrij geregeld in totaal ongeveer 15 exemplaren, waarbij één van een geheel zwarte vorm.

Amathes c nigrum L. Was in het laatst van Augustus buitengewoon talrijk. Meermalen telde ik 's avonds 200 à 300 exemplaren.

Bombycia viminalis F. In andere jaren een zeldzame verschijning, nu tussen 18 Juli en 10 Augustus gewoon (ongeveer 30 exemplaren).

Eupithecia pimpinellata Hb. Verreweg de gewoonste van de kleine spanners. Tussen 21 Juli en 30 Augustus zag ik ongeveer 20 exemplaren.

Semiothisa liturata Clerck. Van deze soort ving ik een exemplaar van f. *nigrofulvata* Collins (SOUTH, pl. 61, fig. 7).

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan ook in een slecht jaar de vangst nog zeer goede resultaten opleveren.

Summary

A number of species is mentioned which were taken at Epen in the south of Dutch Limburg between 15 July and 31 August 1954.

The most interesting are a specimen of the extremely rare *Cerura erminea* Esp., and the first Dutch specimen of *Plusia bractea* F.

Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22.

Macrolepidoptera van Vlieland. We zijn deze zomer (1954) op Vlieland geweest en natuurlijk hebben we niet veel gevangen. Toch was het een prachtig gezicht op de zonnige dagen als de honderden paarlemoervlinders over de braamstruiken vlogen. De eerste week van Juli waren alle drie soorten volop aanwezig (*charlotta* = *aglaja*, *niobe* en *lathonia*). De 15e Juli kon ik geen *lathonia* meer vinden maar de beide andere soorten verdrongen elkaar nog op de struiken.

Een soort, die CAMPING nog niet opgaf, is *Abraxas sylvata* Sc., 5.VII.1954. Ook zagen we nog 1 ex. van *Hydrelia flammeolaria* Hufn., waarvan CAMPING er ook 1 ving.

De rupsen van *Lasiocampa trifolii*, die ik meenam, gaven geen moeite met het verpoppen. De grootste verpopten al gauw in het doosje. De andere kregen thuis *Prunus* bladeren en verpopten tussen de bladeren in de jampot, waar geen zand in zat. Ze aten wel niet zo vlug, maar toch ook niet tergend langzaam en er kwamen goede vlinders uit. Een *Prunus* in de tuin is een groot gemak voor vlindermensen !

G. VAN MINNEN, Fonteinstraat 26, Leeuwarden.