

op de door DE MARSEUL (1879) beschreven *larvipennis*, bekend van Egypte. Dit is gebleken een wel nauwverwante, doch afzonderlijke oost-mediterrane soort te zijn, zodat SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1923) de oude soort *constrictus*, beschreven door CURTIS in 1838 van de Engelse kust, weer in ere kon herstellen.

Aan de Engelse Zuidkust en de Franse Westkust komt nog een derde zeer verwante soort voor, n.l. *A. crotchi* Pic (*salinus* Crotch), die van onze kust nog niet bekend is. Franse exemplaren van deze soort zag ik in de collectie P. VAN DER WIEL. Hoewel dus thans van het subgenus *Cyclodinus* nog slechts één soort uit ons land bekend is, geef ik hierbij een korte determinatietabel voor de drie verwante soorten *constrictus*, *humilis* en *crotchi*, in de hoop, dat de twee laatstgenoemde soorten te eniger tijd in ons land gevonden zullen worden.

♂ op het laatste sterniet met één duidelijk bultje. Kleur der dekschilden lichter of donkerder bruin, zonder duidelijke vlekken-tekening. Halsschild dicht bestippeld, bijna mat. ♂ genitaalapparaat fig. 2

humilis Germ.

♂ op het laatste sterniet met twee duidelijke bultjes, gescheiden door een langsgroefje. Kleur geheel zwart, zonder vlekken; schenen, tarsen en sprieten wat lichter gekleurd. Halsschild zeer fijn en dicht bestippeld. ♂ genitaalapparaat fig. 3

crotchi Pic

♂ zonder bijzondere secundaire kenmerken. Kleur donkerbruin tot zwart, eenkleurig (nominaatvorm) of met op elk dekschild twee vrij goed uitkomende lichtere vlekken (a. *lameyi* Mars.). ♂ genitaalapparaat fig. 1. De aberratie komt in Zeeland meer voor dan de nominaatvorm

constrictus Curt.

Summary

All specimens from Holland, hitherto known as *Anthicus humilis* Germ., proved to be *A. constrictus* Curt. The occurrence of the latter in the Netherlands is restricted to the southwestern islands around the Scheldt, probably the most northern occurrence on the Continent.

Literatuur

- BONADONA, P., 1949, Les Anthicus français du groupe de l'*humilis* Germ., *Revue franç. d'Ent.* 16: 57—64.
 VON KREKICH-STRASSOLD, H., 1919, Ueber *Anthicus humilis* Germ. und verwandte Arten, *Kol. Rundschau* 8: 60—76.
 DE MARSEUL, S., 1879, Monographie des Anthicides de l'ancien-monde, *l'Abeille* 17.
 SAINTE-CLAIRE DEVILLE, J., 1923, *Anthicus constrictus* Curt., a valid species, *Ent. mon. Mag* 59: 3—5.

Nieuw- en St. Joosland (Walcheren).

Pyrgus malvae L., f. *rufa* Tutt. In het Berste Supplement Cat. Ned. Macrolep. wordt deze vorm als zeer zeldzaam vermeld met als enige vindplaats Wolvega. Ik heb er in de zomer van 1954 eens extra op gelet. Hij is bij Wolvega heel gewoon, maar alle exemplaren waren wijfjes.

M. W. CAMPING, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden.