

Summary

Discussion of various Macrolepidoptera, rare in the Netherlands. *Pheosia gnoma* F. var. *desagittalis mihi* is described. The characteristic white wedge-shaped mark near the inner angle of the forewings is not more than a small white point. Holotype: ♂, Aerdenhout, 9.VIII.1953, in my collection.

Een spin in copal van Nieuw-Zeeland (Aran.)

door

W. K. J. ROEPKE

Op de 87e Wintervergadering liet ik een vrij grote spin rondgaan, welke was ingesloten in een harsmengsel. Het voorwerp werd na de oorlog in een winkel te Auckland gekocht als een natuurlijk copal-insluitel en vervolgens gezonden aan een bekende, Rotterdamse natuurhistoricus. Na diens overlijden kwam het in mijn bezit. Ik nam het verleden zomer mede naar Londen en liet het zien op het British Museum (Natural History). Hier herkende men het definitief als een falsificaat. De onnatuurlijke houding der poten — uitgestrekt in plaats van naar binnen gekromd — alsmede het ontbreken van het vierde pootpaar, toont voldoende aan dat het hier een kunstmatig voorwerp betreft. Helaas kon omtrent de identiteit der ingesloten spin geen uitsluitel worden verkregen.

Summary

Discussion of a spider in New Zealand copal which proved to be a falsification. Wageningen, Diedenweg 12.

Over *Hadena irregularis* (Lep.)

door

G. BANK Jr

Op de 87e Wintervergadering heb ik enige bijzondere exemplaren laten zien van *Hadena irregularis* Hufn., nl.:

1. een exemplaar van de 2e generatie, die hier nog niet waargenomen was. Van een klein aantal rupsen, ± 10 stuks, die ik in Juli 1953 uit de bloempjes en zaaddozen van *Silene otitis* had gekweekt, kreeg ik 6 poppen. Op 29 Augustus 1953 kwam er reeds een vlinder te voorschijn. Deze behoort dus tot een 2e generatie. De andere poppen overwinterden en leverden in Juli 1954 de vlinders.

2. Een exemplaar, dat een enigszins afwijkende asymmetrische tekening vertoont. Ten eerste is de ronde vlek op beide voorvleugels uitgerekte in de richting van het wortelveld. Verder springt op de rechtersvoorvleugel de lijn, die het middenveld franjewaarts begrenst, onderaan sterk naar binnen, zodat deze de lijn wortelwaarts langs het middenveld raakt en dit laatste hierdoor in tweeën gedeeld wordt. Dit ex. is gevangen te Egmond aan Zee op 20 Juni 1954.

Summary

Demonstration of 2 interesting specimens, 1. the 2nd generation, and 2. a variation.