

H o l o t y p e : ♀, Eerbeek, Veluwe, Prov. of Guelderland, Netherlands, June 1916, leg. Valck Lucassen. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, No. 38.

The following bibliography of *F. thijsssei* can be given:

- 1.V.1942. STÄRCKE, *Ent. Ber.* 11 : 43, *F. pratensis* Retz. ab. *thijsssei*, ♀.
 1943. STÄRCKE, *De Levende Natuur* 48 : 7, *F. pratensis* Retz. ab. *thijsssei*, ♀.
 1944. STÄRCKE, *Nat. Hist. Maandblad Limburg* 33 : 74, *F. pratensis* Retz., ab. *thijsssei*, ♀.
 (?) 7.VI.1947. STÄRCKE, *Ent. Ber.* 12 : 144, *F. rufa rufa* Nyl., ♀ nov. syn.

Summary

STÄRCKE considered this female to be a variety of *F. congerens* Nyl. 1846 (= *F. pratensis* Auct. nec Retz.). Undoubtedly it looks much like a queen of this species except its much more shining gaster. This, however, is a striking character, because the gaster of *F. congerens* is always very dull.

In the near future a new species allied to *F. thijsssei* will be described by Dr YARROW. This is common in the boreal countries of Europe. The female of *F. thijsssei* differs only from this new species by a duller gaster.

From Dr YARROW the author received some queens and workers, collected in England, which he considers to belong to *F. thijsssei*. The only difference between these females and the queen of *F. thijsssei* is the presence of some short hairs on the underside of the head of the latter. The workers above mentioned are characterized by the absence of hairs on the head behind the eyes and the ocelli, by the hairy eyes and by the presence of erect hairs on the entire outside of the tibiae III. No other species known possesses this combination of characters.

STÄRCKE described as *Formica rufa rufa* workers with the same characters from the Netherlands, which had been collected by ELTON. It is possible that these were workers of *F. thijsssei*. But so long as authentic material has not been studied we cannot have certainty.

Deventer, Duymaer van Twiststraat 2.

Vangsten van zeldzame Lepidoptera in 1954

door

G. A. BENTINCK

Op de 87e Wintervergadering, 13 Februari 1955, demonstreerde ik de volgende Lepidoptera, welke van bijzondere betekenis voor de Nederlandse Fauna zijn :

I. Wat mijn eigen vangsten betreft :

- a. Een exemplaar van *Arctia villica* L., en een van *Epirrhoë galiata* Hb., respect. op 27 en 26 Juni 1954 te Domburg gevangen.
- b. Een exemplaar van *Spilosoma menthastri* ab. *godarti* Obth., en een exemplaar van *Leucania l-album* L., beide op 18 Juni 1954 te Amerongen gevangen.
- c. Een ♀ exemplaar van *Philereme transversata* Hfn. (= *rhamnata* Schiff.) op 31 Juli 1954 te Meerssen gevangen.
- d. Een exemplaar van *Nephoptyx similella* Zk. op 20 Juni 1954 te Amerongen gevangen.

- e. Een exemplaar van *Grapholitha cosmophorana* Rtzb. op 29 Mei 1954 te Amerongen gevangen.
- f. Twee exemplaren van *Pammene aurantiana* Stgr. op 17 Aug. en 2 Sept. 1954 te Amerongen gevangen. In Tschr. v. Ent. 73 : XXIV vermeldde ik het 3e exemplaar voor Nederland, terwijl VÁRI in Ent. Ber. 13 (307): 197 het 4e vermeldde, zodat deze twee de 5e en 6e exemplaren van deze overal zeer zeldzaam voorkomende soort zijn. (De heer A. DIAKONOFF vermeldde ter vergadering nog een ♂, gevangen bij een vanglamp op 22.VIII.1954 door de heer J. J. MEURER te Hillegom).
- g. Twee exemplaren van *Psoricoptera gibbosella* Z. op 1 en 2 September 1954 te Amerongen gevangen.
- h. In de Zeitschr. Wiener ent. Ges. 64 (38. Jg.): 160—170, 191—196, toont KLIMESCH in 1953 door zijn artikel: „Die europäischen *Trifurcula*- und *Ectoedemia*-Arten” aan, dat *Zimmermannia heringiella* Doets, volgens genitalliën-onderzoek, geheel identiek is met *Trifurcula atrifrontella* Stt. Daar de laatste naam prioriteitsrecht heeft, moet de soort thans heten *Ectoedemia atrifrontella* Stt., en hierdoor vervalt de eerst genoemde van de lijst der Nederlandse Microlepidoptera.
- II. Namens de heer Jan SCHURINGA, Med. Stud. te Zeist: Een exemplaar van *Daphnis nerii* L. op 27 Juli 1952 te Zeist gevangen, nl. overdag voor een winkelraam, dat 's avonds met kwiklampen wordt verlicht. Deze fraaiste van alle inlandse nachtvlinders komt zeer zelden als trekvlinder uit Z.-Europa hier te lande aangevlogen.

Summary

Details about various Macro- and Microlepidoptera, rare in the Netherlands.

Interessante vangsten van Macrolepidoptera

— door —

D. VAN KATWIJK

Op de 87e Wintervergadering heb ik de volgende vlinders gedemonstreerd :

1. *Danaus plexippus* L., gevangen „enkele mijlen uit de kust”. Het staat evenwel niet vast of de Nederlandse dan wel de Engelse kust wordt bedoeld; ik zal trachten dat nog na te gaan.

2. *Cryphia muralis* Forst. In een serie van gekweekte imagines blijkt dat de gele vorm, welke meestal als „verschoten” wordt aangemerkt, toch ook als zodanig uit de pop kan komen. Ik had daarvan slechts één dier op 60 stuks.

Alle bekende aberraties dezer soort uit ons land, komen ook bij Vlaardingen voor. Het verzamelen geschiedt door de beperkte vindplaats te inspecteren op het ogenblik dat de vliegtijd begint en dan 10 à 20% van de gevonden cocons mede te nemen.

3. *Coenonympha pamphilus* L. Behalve de seizoensvormen komen in Vlaardingen voor de aberraties: *obsoleta* Tutt, *impupillata* Lpk., *neca* Strand, *ocellata* Tutt, *lineigera* Strand, *pallida* Tutt, *bavelaari* Lmbll., *nigromarginata* Lpk., *nosalica* Prf., *unicolor* Tutt, *molckeniana* Strand, *addenda* Rev., *biocellata* Strand, *mi-*