

- e. Een exemplaar van *Grapholitha cosmophorana* Rtzb. op 29 Mei 1954 te Amerongen gevangen.
- f. Twee exemplaren van *Pammene aurantiana* Stgr. op 17 Aug. en 2 Sept. 1954 te Amerongen gevangen. In Tschr. v. Ent. 73 : XXIV vermeldde ik het 3e exemplaar voor Nederland, terwijl VÁRI in Ent. Ber. 13 (307): 197 het 4e vermeldde, zodat deze twee de 5e en 6e exemplaren van deze overal zeer zeldzaam voorkomende soort zijn. (De heer A. DIAKONOFF vermeldde ter vergadering nog een ♂, gevangen bij een vanglamp op 22.VIII.1954 door de heer J. J. MEURER te Hillegom).
- g. Twee exemplaren van *Psoricoptera gibbosella* Z. op 1 en 2 September 1954 te Amerongen gevangen.
- h. In de Zeitschr. Wiener ent. Ges. 64 (38. Jg.): 160—170, 191—196, toont KLIMESCH in 1953 door zijn artikel: „Die europäischen *Trifurcula*- und *Ectoedemia*-Arten” aan, dat *Zimmermannia heringiella* Doets, volgens genitaliën-onderzoek, geheel identiek is met *Trifurcula atrifrontella* Stt. Daar de laatste naam prioriteitsrecht heeft, moet de soort thans heten *Ectoedemia atrifrontella* Stt., en hierdoor vervalt de eerst genoemde van de lijst der Nederlandse Microlepidoptera.
- II. Namens de heer Jan SCHURINGA, Med. Stud. te Zeist: Een exemplaar van *Daphnis nerii* L. op 27 Juli 1952 te Zeist gevangen, nl. overdag voor een winkelraam, dat 's avonds met kwiklampen wordt verlicht. Deze fraaiste van alle inlandse nachtvlinders komt zeer zelden als trekvlinder uit Z.-Europa hier te lande aangevlogen.

Summary

Details about various Macro- and Microlepidoptera, rare in the Netherlands.

Interessante vangsten van Macrolepidoptera

— door —

D. VAN KATWIJK

Op de 87e Wintervergadering heb ik de volgende vlinders gedemonstreerd:

1. *Danaus plexippus* L., gevangen „enkele mijlen uit de kust”. Het staat evenwel niet vast of de Nederlandse dan wel de Engelse kust wordt bedoeld; ik zal trachten dat nog na te gaan.

2. *Cryphia muralis* Forst. In een serie van gekweekte imagines blijkt dat de gele vorm, welke meestal als „verschoten” wordt aangemerkt, toch ook als zodanig uit de pop kan komen. Ik had daarvan slechts één dier op 60 stuks.

Alle bekende aberraties dezer soort uit ons land, komen ook bij Vlaardingen voor. Het verzamelen geschiedt door de beperkte vindplaats te inspecteren op het ogenblik dat de vliegtijd begint en dan 10 à 20% van de gevonden cocons mede te nemen.

3. *Coenonympha pamphilus* L. Behalve de seizoensvormen komen in Vlaardingen voor de aberraties: *obsoleta* Tutt, *impupillata* Lpk., *neca* Strand, *ocellata* Tutt, *lineigera* Strand, *pallida* Tutt, *bavelaari* Lmbll., *nigromarginata* Lpk., *nosalica* Prf., *unicolor* Tutt, *molckeniana* Strand, *addenda* Rev., *biocellata* Strand, *mi-*

nor Agassiz, *major* Agassiz en *transiens* Caruel. Voorts had ik enkele opvallende exemplaren met bijzonder groot apicaalooog aan de bovenzijde en met niet gesloten apicaalooog aan de onderzijde, alsmede een dier, dat bijna het slachtoffer was geworden van een vogel, want op alle 4 vleugels is duidelijk de afdruk van een vogelsnavel te zien.

4. *Hydraecia fucosa* Fr. Behalve de typische vorm ving ik in Vlaardingen de vormen: *fucosa-alba* Hdm., *palescens* Stgr., *palescens-albo* Hdm., *intermedia* Tutt, *intermedia-flavo* Tutt, *grisea* Tutt, *grisea-flavo* Tutt, *rufa-flavo* Tutt, *brunnea* Tutt, *brunnea-flavo* Tutt en *obscura-flavomaculata* Lpk. Bovendien had ik een bijzonder donker (niet melanistisch) exemplaar met groenige tint, geheel gevulde vlekken, zonder spoor van wit, geel of oranje. Dit dier is, althans voor Nederland, nieuw.

5. *Apamea secalis* L. Van dit dier ving ik de volgende vormen in Vlaardingen: *reticulata-flavo* Tutt, *grisea-albo* Tutt, *i-niger-albo* Tutt, *i-niger* Hw., *oculea* Gn., *oculea-flavo* Tutt, *nictitans-linea* Tutt, *rava* Hw., *lugens* Hw., *lugens-flavo* Tutt, *rufa-albo* Tutt, *rufa-flavo* Tutt, *secalina* Hb., *secalina-linea* Tutt, *flavostigma* Lpk., *pulverosa* Warr. en *obsoleta* Lpk.

Alle dieren zijn verzameld in 1952—1954.

Ik heb met dit materiaal nog eens willen aantonen, hoe belangrijk het is ook op de gewone dieren te letten, daar men daarmee zeer mooie resultaten kan bereiken, mits men series ervan verzamelt. Persoonlijk bevredigt mij dit veel meer dan het speuren naar zeldzame soorten, die men vaak maar nauwelijks inlands kan noemen. Het spreekt echter vanzelf, dat ik, waar mogelijk, ook de zeldzame dieren in mijn collectie opneem.

Summary

Demonstration of some common Netherlands species of Lepidoptera with their aberrations, collected at Vlaardingen, Prov. of Zuid-Holland.

Vlaardingen, Prins Hendriklaan 58.

Oecologische gegevens omtrent Nabis boops Schioedte (Hemiptera Heteroptera)

door

W. H. GRAVESTEN

In de Naamlijst van Dr RECLAIRE worden onder *Nabis major* Costa twee vindplaatsen aangegeven van brachyptere exemplaren: 1° van Apeldoorn (FOKKER) en 2° van Nunspeet (MAC GILLAVRY), met de veronderstelling, dat deze tot *boops* Schioedte zouden behoren. Inderdaad wordt dit later in het 2e vervolg van deze naamlijst, naar aanleiding van een mededeling van Dr MAC GILLAVRY op de 68e Wintervergadering, bevestigd.

Vele jaren later werd een derde vindplaats van deze zo zeldzame wants bekend door een toevallige vondst van een buitenlandse gast op ons Entomologisch Congres, de heer LESTON, op de Hogé Veluwe in 1951.

Deze zomer was ik onder auspiciën van het „Wetenschappelijk Duinonderzoek”