

tergite — seems to be very local and has been taken together with *Allodynerus rossii* (Lep.) which might be the host.

The ♂ genitalia are distinctly different so that it seems justified to consider *immaculata* as a good species. I leave it to LINSSENMAIER, who simultaneously came to the same conclusion, to take a definite decision.

Literatuur

BUYSSON, R. DU, 1898, Contribution aux Chrysidides du globe (3e série), *Rev. d'Ent., Caen*, 17 : 125—147, Pl. I.

BLÜTHGEN, P., 1951, *Chrysis brevitarsis* Thoms., eine verschollene Art. *Nachrichten Nr. 30, Naturw. Museum der Stadt Aschaffenburg*, p. 60—61.

LINSSENMAIER, W., 1951, Die europäischen Chrysididen. *Mitt. schweiz. ent. Ges.* 24 : 83. Rotterdam, Allard Piersonstraat 28c.

Verspreiding van Psychiden door vogels. In *Flora og Fauna* 60 : 122—127 (1954) deelt P. L. JØRGENSEN mee, hoe hij waarnam, dat wijfjes van *Acanthopsyche atra* L. een paar dagen na de paring hun zak verlieten en op de grond vielen, waar zij makkelijk door vogels ontdekt kunnen worden. Elf van deze bevruchte wijfjes werden aan een gevangen Roodborst gevoerd, de excrementen van de vogel van de eerste 24 uur bewaard en af en toe bevochtigd en twee weken later kwamen 30 à 40 rupsen uit. Niet veel dus, maar genoeg om te bewijzen, dat de soort op die manier door vogels verspreid kan worden. — LPK.

Bizondere vangsten van Rhopalocera in 1953. Hoewel een beetje laat, geef ik hierbij een lijstje van enkele goede vangsten van dagvlindervormen in 1953.

Pyrgus malvae L., f. *bilineata* Reverdin. Epe, Gld., ♂, 24 Mei; f. *taras* Bergsträsser, op dezelfde vindplaats een ♀ op 26 Mei.

Anthobocaris cardamines L., f. *caulotostica* Williams. Epe, ♂, 24.V.

Pieris napi L., f. *fuscoignata* Lempke. Deze interessante vorm ving ik in het voorjaar in verse toestand. De tekening van alle vleugels is bruin. Amsterdam, ♀, 23 Mei.

P. napi f. *trimaculata* Rocci. Een prachtig exemplaar, dat tegelijk zeer duidelijk f. *subtus-confluens* Kautz is. Amsterdam, ♀, 10.IX, ab ovo.

f. *conjuncta* Lempke, Amsterdam, twee wijfjes, 5.VII en 10.VII.

f. *pseudoradiata* Müller. Amsterdam, twee wijfjes, 29.VI, en Leusden, 28.VIII.

f. *aversomaculata* Stach × f. *subtus-magnomaculata* Kautz. Amsterdam, ♂, 13.VIII. Pathologisch exemplaar: rechter achtervleugel op de onderzijde gedeeltelijk verbleekt. Epe, ♀, 24.V.

Polygonia c. album L., f. *f-ablum* Esper. Een prachtig gaaf ♂ te Hierden op 12.VII.

Lasiommata megera L. Een exemplaar, waarbij het apicale oog slechts op de linker voorvleugel aan de onderzijde dubbel gekernd is. Amsterdam, ♂, 11.X.

Maniola jurtina L. Een prachtige gynaandromorph, links ♀, rechts ♂, Amsterdam, 28.VI. Van dezelfde soort een mooi ♂, met symmetrische lichte vlekken op boven- en onderzijde der vleugels. Amsterdam, 25.VI.

Coenonympha pamphilus L., f. *caeca* Oberthür. Amsterdam, ♀, 7.V; Amersfoort ♂, 23.VIII.

f. *pallida* Tutt. Epe, ♂, 25.V.

Heodes tityrus Poda. Een vorm, waarbij op de onderzijde der vleugels de submedian vlekkenrij verdwenen is; slechts enkele zwarte vlekken zijn overgebleven. Epe, ♀, 26.V.

H. J. L. T. STAMMESHUS, Grensstraat 15, Amsterdam-O.

[Het laatste exemplaar behoort tot f. *aricia* Cabeau, 1920, *Rev. mens. Soc. Namur.*, vol. 20, p. 3 (*caeca* Courvoisier, 1912, *Iris*, vol. 26, p. 63, nec *caeca* Courv., 1907, *Z. wiss. Ins. biol.*, vol. 3, p. 75. De vorm was nog niet uit ons land bekend. — LPK.]