

595.106792
.E61
Insects

DIV. INS.
U. S. NATL. MUS.

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

Deel 15

1 Juli 1955

No 19

Adres der Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: A. J. Gorter: Bijdrage tot de kennis der Vlinderfauna van de Stichtse Heuvelrug (p. 425). — J. B. M. van Dinther: *Laphygma frugiperda* S. & A. and *Mocis repanda* F. in Suriname (p. 427). — Tjoa Tjien Mo: Additional Notes on *Coccomyza leefmansii* Nijveldt, egg predator of *Pulvinaria polygonata* Ckll. and *Pulvinaria psidii* Mask. in West Java (p. 432). — W. J. Kabos: Fucicole acalyprate Diptera (p. 434). — W. Nijveldt: Additional notes on my paper on the range of prey of *Phaenobremia aphidivora* Kffr. and *Ph. urticae* Rübs. (Diptera, Itonididae) (p. 436). — L. G. E. Kalshoven: Notes on the habits and ecology of Indonesian forest insects of minor importance. I (p. 438). — Literatuur (p. 437: D. J. Kuenen). — Korte mededelingen (p. 426: M. W. Camping; p. 431, 435, 437: Mededelingen).

Bijdrage tot de kennis der Vlinderfauna van de Stichtse Heuvelrug

door

A. J. GORTER

II

Sinds ik in Mei 1952 een eerste mededeling deed over de Macrolepidoptera van de Stichtse Heuvelrug, waarvan het voorkomen in dit gebied nog niet bekend was (zie *Ent. Ber.* 14: 65—66), zijn nu ongeveer drie jaar verlopen. Geregelde dagelijkse lichtvangst, de laatste twee jaar op twee, enkele kilometers van elkaar gelegen plaatsen met twee kwikdamplampinstallaties, leverde de volgende gegevens op, waarbij inbegrepen zijn die, welke verkregen werden door incidentele vangsten elders in de omgeving van Zeist.

Gastropacha populifolia L. Eén exemplaar te Zeist in 1954.

Harpyia bicuspis Bkh. Op verschillende plaatsen in Zeist in twee opeenvolgende jaren (1953—1954).

Drepana curvatula Bkh. Plaatselijk in een bos, waarin veel elzen staan (VAN ZELM leg.).

Celama bolsatica Sauber. Enkele exemplaren.

Philea irrorella Cl. Eén exemplaar. Was reeds bekend van De Bilt, maar ik weet niet, of dit exemplaar uit de heuvelrug afkomstig is, of uit de lager gelegen streken. Het mijne werd in Zeist gevangen op het hoge gedeelte.

Callimorpha dominula L. Een verrassende en onverklaarbare vangst op 26.V.1953 te Zeist. Het exemplaar was afgevlogen, vermoedelijk door fladderen in de vangteist.

Amathes agathina Duponchel. Eén exemplaar te Zeist op 13.IX.1953.

Mythimna l. album L. Voor het eerst in 1953 twee exemplaren.

Mythimna conigera Schiff. Op 1.VII.1953 een exemplaar te Zeist.

JUL 22 1955

- Brachionycha sphinx* Hufn. Eén exemplaar te Zeist.
Graptolitha ornitopus Hufn. Eén exemplaar te Zeist op 3.X.1954.
Nonagria typhae Thunberg, Zeist, een exemplaar in 1953.
Arenostola phragmitidis Hb. Eén exemplaar te Zeist in 1953.
Sedina büttneri Hering, Zeist, een exemplaar op 14.X.1953.
Enargia paleacea Esp. Werd behalve in Zeist (1951), ook in meerdere exemplaren te Amerongen gevangen.
Hyppa rectilinea Esp. In enkele exemplaren in het bosbesgebied bij Austerlitz in 1953.
Miana literosa Hw. Eén exemplaar te Zeist in 1953.
Procus versicolor Bkh. Van deze nog altijd zeer locale en zeldzame soort werd op 17.VI.1953 een mooi vers ♂ te Austerlitz gevangen.
Plusia pulchrina Hw. In 1954 te Zeist.
Melanthia procellata Schiff. Eén exemplaar te Austerlitz in 1954.
Thera variata Schiff., vermeld in de eerste mededeling van 1952, moet vervallen, daar de determinatie niet juist was.
- Zeist, Princes Beatrixlaan 12.

Vlindervangsten in de Oude Venen. Al heb ik door het slechte weer maar weinig in 1954 naar de Oude Venen bij Eernewoude kunnen gaan, er valt toch nog wel wat te melden. *Metrocampa margaritata* L., die ik niet uit het moerasgeboied ken, was op 15 Juni vrij gewoon op de lamp. *Anticollix sparsata* Tr., die nog niet uit het Noorden vermeld was, verscheen toen ook. Op 3 Augustus was *Arenostola brevilinea* Fenn in behoorlijk aantal present, al kwam er die avond betrekkelijk weinig op de lamp. Het meest vermeldenswaard van die nacht is een gaaf exemplaar van *Diataraxia splendens* Hb., verder *Parastichtis suspecta* Hb. en een volkomen gaaf exemplaar van *Celama bolsatica* Sauber, wel een gekke vindplaats voor deze soort.

Van 6 op 7 Augustus heb ik een fantastische nacht in de Oude Venen doorgebracht. 's Avonds gaf het weerbericht: nadering van een koude depressie, voorafgegaan door een warmtefront met regen en onweer. Ik kon geen mens opwarmen om mee te gaan, zodat ik er maar alleen op uit gegaan ben. 't Werd een nacht om nooit te vergeten: donder en bliksem niet van de lucht, maar vlinders bij duizenden! Om een uur of drie moest ik wel opbreken, omdat mijn petroleum op was. En toen brak prompt de bui los, en wat voor een bui! Het was grijs van de regen en met alleen mijn zaklantaartje vergiste ik me 90° in de koers, zodat ik bijna een uur in het manshoge riet heb rondgedarteld, voor ik mijn bootje had. Toen ik bij de wagen was, was ik nat tot op mijn huid, maar de vangst loonde de moeite!

Van *brevilinea* maar een paar. *Nonagria neurica* Hb. bij tientallen (de meeste afgevlogen), *Eilema griseola* Hb. bij honderden, waaronder drie prachtexemplaren van f. *flava* Hw., veel *Epione repandaria* Hufn., een paar exemplaren van *Sterrha emarginata* L., *Petilampa arcuosa* Hw., *Deprana curvatula* Bkh. bij honderden, *Pelosia muscerda* Hufn. dito. Toevallig ontdekte ik tussen deze laatste soort een *obtusa*, zodat ik ze verder wel stuk voor stuk heb moeten bekijken. Maar op het scherm zie je haast geen verschil. 't Was om stapelgek te worden, al die *muscerda*'s! In totaal heeft die nacht me twee *Pelosia obtusa* H. S. opgeleverd. Tussen al die *muscerda*'s pikte ik wonderlijk genoeg ook een *Eilema pygmaeola* uit, een volkomen gaaf dier, dat in niets van de duinexemplaren afwijkt.

M. W. CAMPING, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden.