

Literatuur

- BEZZI, M., 1903, Katalog der paläarktischen Dipteren, 2, Budapest.
 CHOPARD, L., 1943, Orthoptéroïdes de l'Afrique du Nord, Fauna de l'Empire Français, 1, Paris.
 LAMEERE, A., 1907, Manuel de la faune de Belgique, 3, Bruxelles.
 LINDNER, E., 1938, Stratiomyidae, Die Fliegen der palaarktischen Region, 18, Stuttgart.
 LUNDBECK, W., 1907, Diptera danica, 1, Copenhagen.
 MEIGEN, J. W., 1822, Systematische Beschreibung der bekannten Europäischen Zweiflügeligen Insekten, 3, Hamm.
 MEIJERE, J. C. H. DE, 1928, Vierde supplement op de nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera, *Tijdschr. v. Ent.*, 71.
 SCHINER, J. R., 1862, Fauna austriaca. Die Fliegen (Diptera), 1, Wien.
 SÉGUY, E., 1926, Diptères (Brachycères), Faune de France, 13, Paris.
 ———, 1932, Etude sur les diptères parasites ou prédateurs des sauterelles, *Encycl. Ent. Diptera*, 6.
 ———, 1950, La biologie des diptères, *Encycl. Ent.*, (A), 26, Paris.
 SZILÁDY, Z., 1932, Waffnenfliegen, Stratiomyidae, Tierw. Deutschl., 26, Jena.
 VERRALL, G. H., 1909, British flies, 5, London.
 WULP, F. M. VAN DER, 1877, Diptera Neerlandica, de tweevleugelige insecten van Nederland, 1, 's-Gravenhage.
 ——— & J. C. H. DE MEIJERE, 1898, Nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera, Bijvoegsel *Tijdschr. v. Ent.*, 41.

Summary

In the present paper the author discusses the occurrence of the Stratiomyid *Geosargus (Chrysochroma) bipunctatus* (Scopoli 1763) in the Netherlands. Fig. 2 gives the records of this species in Holland; there is a remarkable concentration of localities in the diluvial part of the country, whereas the two localities no. 1 (Heemstede) and no. 4 (The Hague) are more or less isolated. There is considerable doubt about the locality no. 13, "province of Limburg", based on an old record of 1877. I could not trace any specimen of this fly caught in Limburg, but there is an old record by MEIGEN (1822): "Aix-la-Chapelle" (Aachen), a German town near the Dutch frontier of the province of Limburg. However, this is not sufficient to annul the doubt about the Dutch record.

Geosargus bipunctatus is a central and southern european species which has its northern limit in England at Inverness (VERRALL, 1909), Holland and the northern part of Germany. Textfig. 3 gives the (hypothetical) northern boundary of this fly in western Europe.

Metronia rubicunda Guér. (Col.) te Nisse (Zd. Beveland). Juni 1954 ontving ik van de heer C. BERMAN, fruitteler te Nisse, een kever behorende tot de Cassidae, door hem gevangen op een appelboom in zijn boomgaard aldaar.

De kever was niet te determineren met CALWER en werd op de Jaarvergadering van de Ned. Ent. Ver. te Domburg ter hand gesteld aan de heer P. v. D. WIEL voor onderzoek naar de herkomst. Deze bericht mij thans, dat de naam van de kever werd vastgesteld als *Metronia rubicunda* Guér. en dat de kever thuis behoort in Brazilië, Bolivia en Paraguay!

Hoe deze kever, die mij nog in goede staat *levend* ter hand werd gesteld, heeft kunnen doordringen tot het hartje van Zuid-Beveland, zal wel altijd een raadsel blijven.

B. J. J. R. WALRECHT, Biezelinge.