

Moreover it is clear that not only the wintergeneration but also the summer generation can mate and oviposit in captivity.

Samenvatting

Het kweken van *Nymphalis io* L. en *Aglais urticae* L. met kunstmatige belichting.

Volgens FISCHER (1) is de kans slechts gering dat copulatie van *N. io* L. en *A. urticae* L. in gevangenschap gelukt, ook al geeft men zoveel buitenlucht en zonlicht als mogelijk is.

Vroegere pogingen met *N. io* L. en *Papilio memnon memnon* L. met en zonder electrisch licht zijn mislukt.

Poppen van de eerste zomergeneratie van *N. io* L. werden geplaatst in een lichtbak die verlicht was met 8 TL-buizen van 40 W/33 (z.g. „wit licht”). Tweehonderd poppen leverden ca. 10.000 eieren op. In 3 maanden hebben wij 4 achtereenvolgende generaties met evenveel succes gekweekt, zodat de methode zich uitstekend schijnt te lenen voor massa-kweek. Ook voor *A. urticae* L. bleek de methode te voldoen.

Literature

- (1) FISCHER, E., 1926, Züchtung der Lepidopteren, in: ABDERHALDEN, Hdb. d. biolog. Arbeitsmeth., Abt. IX, T. 1, 2, pp. 277—356. Berlin-Wien.

Nieuwe vindplaats van *Epirrhoe tristata* L. Op 19 Augustus 1955 ving ik te Deventer op licht een zo goed als gaaf exemplaar van *Ep. tristata*. Ongetwijfeld is dit een nieuwe vindplaats voor deze Geometride in het Oosten van het land.

W. OORD, Potterstraat 16, Deventer.

Afdelingsvergaderingen. De afdeling Noord-Holland en Utrecht zal in dit winterseizoen nog vergaderen op 30 November, 25 Januari en 7 Maart, telkens om 8 uur 's avonds in hotel Krasnapolsky.

De afdeling Zuid-Holland zal nog vergaderen op 14 December en 8 Februari in hotel Terminus te Den Haag en op een nog nader vast te stellen datum in April te Leiden in het Rijks Museum van Natuurlijke Historie.

DE AFDELINGSSECRETARISSEN.

Döring, E., Zur Morphologie der Schmetterlingseier. 154 pagina's, 58 ongekleurde en 3 gekleurde platen met 2645 figuren. Akademie-Verlag, Berlin W 8, Mohrenstrasse 39. 1955. Prijs gebonden D.M. 33.

In dit boek worden de eieren van 622 vlindersoorten afgebeeld en beschreven. Het is daardoor het uitvoerigste werk, dat nog toe over vlindereieren gepubliceerd is. Van elk ei wordt een figuur van boven- en zij aanzicht gegeven en een sterker vergrote afbeelding van de micropyle en van een stukje van de zijwand. Alle afgebeelde eieren zijn door middel van tabellen te determineren. Soms hebben naverwante soorten eieren, die veel op elkaar lijken, maar het komt ook voor, dat bij soorten, die tot hetzelfde geslacht behoren, belangrijke verschillen aangetroffen worden.

De figuren zijn keurig getekend en laten duidelijk zien hoe sierlijk vaak de vlindereieren van vorm en structuur zijn. Een boek, dat stellig aanbevolen kan worden, ook al is het dan niet volledig. — LPK.