

Enige aantekeningen over het genus *Meligethes* Steph. (Col.)

door

A. C. NONNEKENS

Sinds enige jaren heb ik nauwkeurig onderzocht op welke bloemen men de soorten van het genus *Meligethes* kan aantreffen. Als resultaat van dit onderzoek kan ik van onderstaande soorten als aanvulling op of in afwijking van wat EVERTS, REITTER en KHUNT daarover hebben geschreven, het volgende meedelen:

M. subrugosus Gyll. Deze soort heb ik op meerdere plaatsen in de omgeving van Blaricum in groot aantal gevangen, uitsluitend op *Succisa pratensis*. Volgens EVERTS tamelijk zeldzaam op allerlei bloemen.

M. ovatus St. In het Amsterdamse Bos in aantal op *Glechoma hederacea*.

M. viduatus Strm. op *Galeopsis ochroleuca* en *G. tetrabit*, vooral op de eerstgenoemde soort. Blaricum, 3—15.VIII.1951.

M. coeruleovirens Forst. in groot aantal op *Cardamine pratensis*. Naarden (oeverland bij Oud-Naarden), 30.IV.1954.

Volgens EVERTS, REITTER en KHUNT op *Caltha palustris*. Honderden bloemen van *Caltha* heb ik afgezocht in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos en in de omgeving van Vinkeveen, maar zonder resultaat. Ook op het oeverland bij Oud-Naarden bloeiden meerdere pollen Dotterbloemen, maar ook daarop bevonden zich geen *Meligethes*. Wel kwam deze soort in aantal voor op de *Cardamine pratensis*, die tussen de Dotterbloemen bloeiden.

M. haemorrhoidalis Forst. Van deze soort vond ik drie mannetjes op *Lamium album*, twee op *Ficaria verna* en één op *Symphytum officinale*. Op 21 en 23 April 1954 vond ik de kever in aantal op *Tussilago farfara*. EVERTS vermeldt alleen *Lamium album*.

Volgens de determinatietabel van deze auteur en van REITTER is het pygidium van *haemorrhoidalis* geelrood. Dit kenmerk is nogal misleidend, want de wijfjes zijn geheel donker gekleurd. Daardoor is de kever met EVERTS en REITTER niet met zekerheid te determineren. KHUNT heeft het beter gezien, want die zegt, dat de mannetjes een geelrood pygidium hebben. Bovendien heb ik nog opgemerkt, dat de dekschilden bij de wijfjes aan de top voor ongeveer een vijfde deel uiterst fijn gesjagrineerd zijn. Ook dat vind ik niet vermeld.

Summary

A number of *Meligethes* species are mentioned which were found on flowers of plants not in accordance with the literature consulted (EVERTS, REITTER, KHUNT). *M. coeruleovirens* could only be found on *Cardamine pratensis*, not on *Caltha palustris*.

Writer further observes, that with *M. haemorrhoidalis* Forst. only the pygidium of the male is yellow-red, whereas the female is completely dark.

Amstelveen, Da Costalaan 48.