

Schwarz, R., Motyli, I, 1948, II, 1949. Vcsmir, Nakladatelská a Vydavatelska, Spol. S R. O., Praha VII, Dobrovshéko 27.

In deze twee keurig gebonden deeltjes worden de dagvlinders van Tsjecho-Slowakije behandeld. Het eerste bevat een inleiding van 14 pagina's, waarin na het voorwoord schematische figuren van ei, rups, pop en vlinder gegeven worden met de daarbij gebruikte termen, gevolgd door een lijst van technische termen met de verklaringen daarvan. Dan komen 50 gekleurde platen met 291 figuren van vlinders, vaak ook van rupsen en poppen, van de Papilionidae, Pieridae en Satyridae. De hierbij behorende tekst neemt 42 pagina's in beslag.

In deel II worden op dezelfde wijze de overige dagvlinders behandeld. Dit bevat 505 gekleurde figuren met 60 pagina's hierop aansluitende tekst.

De gekleurde platen zijn heel goed en als vergelijkingsmateriaal ongetwijfeld zeer bruikbaar. Over de tekst kan ik niet oordelen, daar deze in het Tsjechisch geschreven is. De nomenclatuur is modern, al ben ik het niet in alle opzichten er mee eens. Blijkbaar begint men zich ook in Midden-Europa te ontworstelen aan de ban van de 50 jaar oude STAUDINGER-REBEL. Elk deeltje kost 146 Tsj. kronen. — Lpk.

Korte mededelingen

Personalia. Het pas verschenen nummer van de Proceedings van onze grote Londense zustervereniging bevat de mededeling, dat Prof. Dr D. J. KUENEN benoemd is tot erelid van de Royal entomological Society of London, een van de hoogste onderscheidingen, die een entomoloog te beurt kunnen vallen. Dezelfde eer genoot Prof. Dr P. GRASSÉ, ook reeds erelid der N.E.V.

Vlindervlucht op vrij grote hoogte. Bij toeval deed ik een waarneming over vlindertrek, die misschien van belang is.

Op 17 Aug. j.l. ca. 16 u. was ik bezig in de tuin van ons lab. een kijker te testen. Ik kreeg toen in mijn gezichtsveld een vlinder, die op ong. 50 m hoogte in NO richting over ons terrein vloog. Ik dacht aan een *Colias* en de heer WILMINK, aan wie ik het voorval vertelde en een schets van de donker-licht verdeling liet zien, concludeerde *Colias croceus*. Ik kon het dier over een meter of 50, 60 volgen. Zijn koers was op dat traject behoorlijk standvastig. Opvallend was, dat hij dit stuk grotendeels zwevend aflegde. Die zweefvlucht zag er niet erg stabiel uit. Af en toe kanteelde hij haast voorover en dan maakte hij enkele vleugelslagen om weer opnieuw te gaan zweven. Ik zag zulk zweven ook wel eens van een paarlmoervlinder (*Argynnis paphia*), maar niet over zo lange einden.

Ik weet natuurlijk niet of de vlinder werkelijk trok, maar het voorval frappeerde mij, omdat wij bij de vogeltrek langzamerhand gemerkt hebben, dat trek op grote hoogte (hier honderden meters) af en toe een heel belangrijke rol speelt. Het heeft wellicht zin om in perioden van vlindertrek geregeld met een kijker de hogere niveaus af te zoeken.

L. TINBERGEN, Zoölogisch Laboratorium, Groningen.

Bekendmaking. Ter inzage zijn verkrijgbaar *supplétoire* lijsten van te verkoop aangeboden Separaten en Verkoopcatalogus van boeken en tijdschriften, alles afkomstig uit de bibliotheek der Ned. Ent. Ver.