

(1943) als f.n.sp. vermeld en in 1948 door SANDERS gevangen te Lerop. Onder mijn *Sphecodes*-materiaal vond VERHOEFF een ♀, dat reeds op 20-VI-1941 te Babberich (G.) was gevangen. De ♂♂ zijn in ons land nog niet waargenomen.

5. *Sph. scabricollis* Wesm. — Van deze soort, waarvan het ♀ in 1879 door RITSEMA in Zuid-Limburg was gevangen en als *perversus* sp. nov. werd beschreven, ving ik een ♂ te Helenaveen (30-VIII-1947). Het exemplaar werd eveneens door VERHOEFF gedetermineerd. Met de opgave van SANDERS (Nat. Mbl. 37 : 52) zijn nu een 7-tal verspreide vindplaatsen van ons land bekend.

6. *Prosopsis difformis* Ev. — Van deze soort, tot nu toe slechts door TEUNISSEN als f.n.sp. vermeld van Haaren (Ent. Ber. 10 : 171), ving ik te Empel (10-VII-1949) op *Allium* een ♂, zéér kennelijk door de vorm van de sprietschaft.

7. *Pr. rinki* Gorski — Hoewel SCHMIEDEKNECHT deze *Prosopsis* als „sehr selten” aanduidt, kon VAN LITH voor ons land reeds 6 verspreide vindplaatsen vaststellen (Ent. Ber. 12 : 108). Zij blijkt inderdaad in Oost. Brabant niet zeldzaam te zijn. Ik kweekte ze regelmatig uit braamstengels (Beers, Helenaveen, Hilvarenbeek, Udenhout). De soort schijnt echter weinig op bloemen te worden aangetroffen en in de afgelopen zomer heb ik voor het eerst een ♂ gevangen op *Rubus*.

8. *Pr. pectoralis* Först. (= *kriechbaumeri* Först.) — VAN DER VECHT geeft hiervan 4 vindplaatsen en noemt de soort zeldzaam (Ent. Ber. 9 : 10). In de omgeving van de Vugtse hei en de Drunense Duinen vind ik regelmatig de nesten van deze *Prosopsis*. In tegenstelling met de vorige echter is zij een typische bewoonster van rietgallen (*Lipara lucens* Meig.), niet van *Rubus*stengels. Overal waar ik deze gallen talrijk aantrof, kweekte ik ook *pectoralis* daaruit.

Literatuur

FRIESE, H., 1923, Die europäischen Bienen — Berlin/Leipzig.

VECHT, J. VAN DER, 1928, Fauna van Nederland. Afl. IV : *Andrena* — Leiden.

Udenhout, Maart 1951.

Nomenclatuur Nederlandse Microlepidoptera. De correcte naam voor de Tortricide, die in onze literatuur bekend staat als *Capua reticulana* Hb., en die in enkele jaren een van de ergste plagen der fruitbomen geworden is, is ***Adoxophyes orana* Fischer von Roeslerstamm**. HÜBNER's soortnaam is ongeldig, daar zijn *Tortrix reticulana* [1818] een primair homoniem is van *Tortrix reticulana* Haworth, 1811. De genusnaam *Capua* Stephens, 1834, is een synoniem van *Epagoge* Hb., [1825] en moet dus uit onze naamlijst verdwijnen (DIAKONOFF, 1939, Zool. Meded. 21 : 163). *Orana* hoort bovendien niet in dit genus, maar in het nauw verwante *Adoxophyes* Meyrick, 1881, waarvan ruim 30 soorten uit de Australische en Indische fauna's bekend zijn, terwijl in Europa en N.-Amerika slechts 1 soort voorkomt.

Een goed artikel over *orana* met foto van de imagines en tekeningen van aderstelsel en genitaliën verscheen van J. D. BRADLEY in Entom. 85 : 1—4, Jan. 1952. — Lpk.