

Korte mededelingen

Geslachtsdimorfisme bij *Lampra fimbriata* Schreber (Lep.). (WARREN's beschrijving van *Triphaena fimbria* L. in Seitz 3 : 63 wijst in de richting van sexueel dimorfisme bij deze soort.

Bij onderzoek van het *fimbriata*-materiaal uit Leiden, Amsterdam en Rotterdam (ruim 100 stuks) is me gebleken, dat alle donkere voorwerpen ♂♂ zijn, terwijl de lichtgekleurde in overgrote meerderheid ♀♀ blijken te zijn; enkele ♂♂ vallen in de rijen der lichtgekleurde.

Wat dit laatste betreft wijs ik er op, dat ook bij de sexueel dimorphe *Triphaena pronuba* L. sporadisch onder de lichte ♀-vormen een ♂ wordt aangetroffen.

In de Catalogus van LEMPKE vinden we bij *fimbriata* 9 kleurvormen aangegeven. Tot de ♂-vormen behoren :

domiduca Hufn. (*brunnea* Tutt), met *solani* F. waarschijnlijk de meest voorkomende ♂-vorm,
brunnea-virescens Tutt, vrij zeldzaam,
fimbriata Schreber, een zeldzame vorm,
parthenius Brgstr., eveneens zeldzaam,
solani F., ongeveer even talrijk als *domiduca* Hufn.,
obscura Lenz, vrij zeldzaam.

Tot de ♀-vorm moeten gerekend worden :

fimbria L., vrij gewoon,
rufa Tutt, gewoon (hieronder vallen ook de lichtgekleurde ♂♂),
virescens Tutt, de minst gewone ♀-vorm.

Tenslotte nog een opmerking over het voorkomen van deze vlinder. Tot 1949 gebruikte ik voor de lichtvangst een gewone lamp van 1000 Watt, daarna twee M-L-lampen van 250 Watt elk. De laatste jaren is *fimbriata*, althans in Midden-Limburg, een gewone verschijning op licht, terwijl voordien slechts een enkel voorwerp werd gezien. Ik kan nauwelijks aannemen, dat de grotere vangsten van nu uitsluitend moeten worden toegeschreven aan het gebruik van menglicht lampen; eerder geloof ik, dat deze prachtige uil thans meer voorkomt dan vroeger.

H. LANDSMAN, Natuurhistorisch Museum, Rotterdam.

[De gecombineerde gegevens van alle verzamelaars hadden mij reeds enkele jaren geleden dezelfde gevolgtrekkingen doen maken als waartoe de heer LANDSMAN aan het slot van zijn mededeling komt. — Lpk.]

Bibliotheek. Van de uitgever P. LECHEVALIER ontving de Bibliotheek : Catalogue des Hyménoptères du Département du Nord et Régions Limitrophes, II, Tenthredoides, par E. CAVRO.

Door de opmerkingen over voedselplanten en enkele systematische aantekeningen heeft deze Catalogus meer dan slechts lokaal-faunistische betekenis.

***Thera juniperata* L. (Lep., Geom.).** Ik heb in de herfst van 1951 eens naar de poppen gezocht en vond ze overal waar *Juniperus* stond. In Leeuwarden vang ik de soort geregeld op licht. De poppen vond ik bij Groningen (in de Hortus), bij Harendermolen en op Vijversburg bij Tietjerk. Op de laatste vindplaats staan maar een paar gekweekte struiken, maar in een half uur tijd vond ik daar ver over de honderd poppen.

M. W. CAMPING, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden.