

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 323

Deel XIV

1 Mei 1952

Adres der Redactie :

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: A. J. Gorter: Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna op de Stichtse heuvelrug (p. 65). — G. Houtman: Twee mineerders, schadelijk voor het appelblad *Nepticula malella* Hb. en *Phytomyza heringiana* Hendel (p. 67). — C. A. W. Jeekel: Milliped Miscellany (p. 71). — H. Boschma: Agenda voor 1953 van de Internationale Commissie voor de Zoologische Nomenclatuur (p. 78). — F. Hemming: International Code of Zoological Nomenclature (p. 78). — Literatuur: (p. 79: B. J. Lempke). — Korte mededelingen: (p. 70: G. L. van Eyndhoven; p. 77: C. J. Verhey, B. J. Lempke, G. Kruseman; p. 80: T. H. van Wisselingh, W. M. Docters van Leeuwen).

Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna op de Stichtse heuvelrug

door

A. J. GORTER

Mijn bedoeling is de resultaten te vermelden van een ruim vijfjarige vangperiode. De gevolgde indeling is gekozen ter beperking van de benodigde plaatsruimte. Over enkele, om een of andere reden, interessantere species is meer uitgebreid verslag uitgebracht. In Zeist werd voornamelijk verzameld in gemengd bos en op heideterrein, in Soest op stuifzandgebied, in Amerongen in gemengd-, maar voornamelijk loofbos. Slechts die soorten zijn genoemd, die òf nog niet bekend waren van deze vindplaatsen, òf mij, om bepaalde redenen, belangwekkend voorkwamen. Is geen andere vindplaats vermeld, dan is bedoeld: Zeist. Bunnik en Rhijnauwen worden enige malen genoemd, doch liggen niet op de heuvels, maar in 't lage land aan de Kromme Rijn.

Zeldzaam komen voor: *Leptidea sinapis* L. (1 ♂ 1945, wijlen Prof. BROUWER leg.); *Mesoacidalia charlotta* Hw. (*aglaja* L.); *Fabriciana niobe* L.; *Dilina tiliae* L. (bij Zeist beslist weinig); *Celerio euphorbiae* L. (1 ex. in 1951); *Notodonta phoebe* Siebert (1 ex. 1951, VLUG leg.); *Clostera anachoreta* F.; *Endromis versicolora* L.; *Eilema deplana* Esp.; *Pelosia obtusa* H.-S. (1 ex. 1951); *Spilosoma urticae* Esp.; *Cynia mendica* Cl. (in Zeist zeldzaam, in Amerongen talrijk); *Synanthedon formicaeformis* Scop.; *Simyra albovenosa* Goeze; *Craniophora ligustri* F. (in Zeist 1 ex., bij Rhijnauwen geregeld); *Cryphia algae* F.; *Diarsia mendica* F. (bij Zeist zelden); *D. brunnea* Schiff.; *Amathes ditrapezium* Bkh.; *Meliana flamma* Curtis (2 exx.); *Orthosia gracilis* F. (bij Zeist zelden, bij Rhijnauwen meer); *Tiliacea aurago* Schiff.; *Agrochola lota* Clerck (bij Zeist zelden, bij Rhijnauwen meer); *Omphaloscelis lunosa* Hw. (2 ♀ ♀); *Parastichtis suspecta* Hb.; *Xylena vetusta* Hb.; *Nonagria sparganii* Esp.; *N. dissoluta* Tr. (1 ex.); *Arenostola pygmina* Hw.; *Enargia paleacea*



Esp. (1 ex.); *Zenobia subtusa* Schiff.; *Charanyca selini* Bsd. (Soest en Amerongen elk 1 ex. leg. resp. CARON en BENTINCK); *Amphipoea fucosa* Frr. (1 ex.); *Hydraecia micacea* Esp.; *Apamea zollikoferi* Frr. (f. *internigrata* Warren) (1 ex. 18-9-'49); *A. unanims* Hb. (Amerongen); *A. oblonga* Hw. (1 ex.); *A. ophiogramma* Esp.; *Plusia confusa* Stphs. (1 ex. 10-8-'45); *Lygephila pastinum* Tr. (2 exx. VLUG leg.); *Catephia alchymista* Schiff. (1 ex. 8-7-'51); *Zanclognatha tarsiplumalis* Hb. (Amerongen); *Calothysanis amataria* L. f. *effusaria* Klem. (1 ex.); *Ortholitha coarctaria* Schiff. (2 exx., VLUG leg.); *Lygris testata* L.; *Thera variata* Schiff.; *Nycterosea obstipata* F. (22-9-'47 2 ♀ ♀); *Perizoma bifasciata* Hw. (2 exx.); *Eupithecia linariata* F.; *Semiothisa signaria* Hb.

Vaker worden gezien: *Aricia agestis* Schiff. (locaal); *Maculineaalcon* Schiff. (op vochtige heide bij Soest en Oud-Leusden); *Celerio gallii* Rott.; *Leucodonta bicoloria* Schiff. (Amerongen); *Clostera pigra* Hufn.; *Lasiocampa quercus* L.; *Dendrolimus pini* L.; *Pelosia muscerda* Hufn.; *Lampra fimbriata* Schreber (wisselend); *Orthosia pulverulenta* Esp. (soms talrijk); *O. munda* F. (ongeregeld); *Tholera cespitis* F. (soms talrijk); *Dasycampa rubiginea* Schiff.; *Tiliacia citrigo* L. (wisselend); *Eumichtis satura* Schiff. (Amerongen); *Pyrrhia umbra* Hufn.; *Nonagria geminipuncta* Hw.; *Hoplodrina blanda* Schiff. (geregeld, maar niet talrijk); *Hapalotis venustula* Hb.; *Celaena leucostigma* Hb.; *Gortyna ochracea* Hb.; (geregeld, soms talrijk); *Procus strigilis* L.; *Apamea fissipuncta* Hw.; *Sterrha fuscovenosa* Goeze; *S. inornata* Hw.; *Mysticoptera sexualata* Retzius; *Eupithecia goossensiata* Mab.; *Ennomos fuscantaria* Stphs.; *Apocheima hispidaria* Schiff.; *Lycia hirtaria* Cl.

Geregeld en in flink aantal vliegen: *Thymelicus lineola* O. (locaal); *Pyrgus malvae* L. (locaal); *Drymonia querna* F., *Pheosia gnoma* F. (is hier veel gewoner dan *P. tremula* Cl.); *Ochrostigma velitaris* Hufn.; *Cilix glaucata* Scop. (talrijk); *Habrosyne pyritoides* Hufn. (geregeld, soms talrijk); *Tethea fluctuosa* Hb. (meestal talrijk, Zeist, Amerongen); *T. duplaris* L. (minder dan vorige species); *Eilema sororcula* Hufn.; *Tyria jacobaeae* L. (plaatselijk zeer talrijk); *Cryphia perla* Schiff. (talrijk); *Pachnobia rubricosa* F.; *Ammoconia caecimacula* Schiff.; *Aletia pudorina* Schiff. (plaatselijk); *A. litoralis* Curtis (op de stuifzandgronden bij Soest, waar helm groeit); *A. albipuncta* F.; *Tholera popularis* F.; *Ceramica pisi* L.; *Phoberia lunaris* F.; *Plusia festucae* L.; *Bomolocha crassalis* F. (bosbesgebied bij Austerlitz); *Alsophila aceraria* Schiff.; *Sterrha emarginata* L.; *Ecliptopera silaceata* Schiff.

Araschnia levana L. is, in 1951 voor het eerst, als imago en rups in Zeist waargenomen in vrij groot aantal; breidt haar vlieggebied dus blijkbaar nog steeds uit.

Amathes glareosa Esp. is in 1918 twee maal in den Dolder gevangen, in 1949 éénmaal in Zeist en in 1951 in Zeist in niet minder dan elf exemplaren. Het heide-bosgebied waar de vlinder in al deze gevallen gevonden werd, is één groot complex. Het ziet er dus naar uit, dat *glareosa* in dit gebied geregeld en soms niet zeldzaam voorkomt.

Zeist, Donkerelaan 38, Januari 1952.