

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 327

Deel XIV

1 September 1952

*Adres der Redactie:*

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12<sup>III</sup>, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: P. J. Brakman: Zeeuwse Wantsenvangsten I (p. 129). — Br. Theowald: Enige nieuwe en schaarse Diptera (p. 131). — K. Lems: Some remarks on Odonata from Holland and Belgium (p. 132). — A. Diakonoff: Case Bearing Lepidoptera IV (p. 134). — Dr René Jeannel: Sur quelques Psélaphides de Java (p. 138). — Literatuur: (p. 143: A. Reyne). — Korte mededelingen: (p. 131, 137, 144: B. J. Lempke; p. 133: E. J. E. Lücker; p. 137: R. Tolman, W. J. Boer Leffel, P. H. van de Pol).

## Zeeuwse Wantsenvangsten I

door

P. J. BRAKMAN

1. *Prostemma guttula* F. Deze fraaie Nabide werd reeds door SNELLEN VAN VOLLENHOVEN van Walcheren, zonder nadere aanduiding, vermeld en werd in latere tijd tweemaal bij Maastricht gevonden. In de afgelopen zomer bleek de soort voor te komen op een duinhelling tussen Domburg en Westkapelle. Van 28-7-1951 tot 31-8-1951 werden hier gevonden 12 ♂♂ en 5 ♀♀ brach., benevens 1 ♀ macr. De dieren bleken bij voorkeur te leven op de warmste plaatsen met korte en spaarzame begroeiing (Sedum, Jasione, Weingaertneria), waartussen onbegroeide plekken. Zij hadden zich verscholen onder stenen, stukjes hout, mos e.d. en waren in de zonneschijn uiterst vlug. De larven, waarvan er verscheidene werden gevonden, leefden op dezelfde plaatsen. Het gelukte me evenwel slechts enkele larven tot imago op te kweken. Als voedsel werden diverse soorten insecten verstrekt, doch kannibalisme kwam nogal eens voor, wat er op zou kunnen wijzen, dat het toegediende voedsel niet het ware was. Op 4-9-1951 kon ik het vervellen van een nymfhe tot imago waarnemen. Het gehele vervellingsproces duurde slechts enkele minuten, het imago was toen geheel licht oranje-rood van kleur. Binnen 24 uur waren de zwarte delen van het lichaam volledig uitgekleurd, doch de bloedrode hemielytra kregen pas hun volle kleur na verloop van drie dagen. De macroptere vorm was in ons land nog niet eerder gevonden en schijnt overal zeldzaam te zijn, waar het dier ook voorkomt. De verspreiding der soort blijkt in hoofdzaak Midden- en Zuid-Europees te zijn, ook in Noord-Afrika is zij gevonden. BUTLER vermeldt (1923), dat uit Engeland in totaal slechts 4 exx. der f. brach. bekend zijn.

2. *Nabis lineatus* Dhlb. bleek in Aug. 1951 talrijk te zijn op een terrein, begroeid met *Scirpus maritimus* L. te Nieuw- en St. Joosland. De dieren waren door slepen niet te bemachtigen, doch hielden zich op aan de voet van de genoemde planten, op de drassige bodem.

3. *Miridius quadrivirgatus* Costa was van eind Juli tot eind Aug. 1951 talrijk aan een dijk bij Nieuw- en St. Joosland. De dieren waren merkwaardigerwijze alleen des avonds te slepen, overdag was er niets te vinden.

DIV. INSECTA  
U.S. NATL. MUS.



4. *Lygus gemellatus* H.S. werd gevonden bij Nisse (Zd. Beveland) op 6-8-1950 op *Atriplex* spec., 1 ♂ en 1 ♀. De heer ED. WAGNER te Hamburg was zo vriendelijk de determinatie te bevestigen. Dat deze soort(?) aan *Artemisia* gebonden zou zijn, wordt door deze vondst twijfelachtig, geen enkele *Artemisia*-soort was op de vindplaats aanwezig.

5. *Stenodema trispinosum* Reut. Op 13-9-1951 werd van deze soort een massa-populatie gevonden in een klein rietmoerasje aan de Sloedam (gem. Arnemuiden). Alles behoorde tot de herfstgeneratie (f. *fuscescens* Reut.). In hetzelfde biotoop bleek ook *St. calcaratum* Fall. voor te komen, doch in een verhouding van ongeveer 1 *calc.* op 9 *trisp.*

6. *Teratocoris antennatus* Boh. Groede (Z. Vlaanderen) 21-8-1951, 4 ♀♀, Nieuw- en St. Joosland 23-8-1951, 1 ♂, in beide gevallen op *Scirpus maritimus* L.

7. *Dicyphus annulatus* Wlff. Biggekerke 15-8-1949 in aantal onder *Ononis repens* L.

8. *Dicyphus epilobii* Reut. is ook in Zeeland overal algemeen op *Epilobium hirsutum* L.

9. *Dicyphus errans* Wlff. Vrouwenpolder 10-8-1949, 1 ex. op *Verbascum Thapsus* L.

10. *Conostethus salinus* J. Shlb. Clinge (Z. Vlaanderen) 7-7-1951, in aantal op de schorren van het verdronken land van Saeftinge op *Juncus Gerardi* Loisl.

11. *Campylomma verbasci* M.D. Vrouwenpolder 8-7-1950, 1 ex. op *Verbascum Thapsus* L.

12. *Acalypta gracilis* Fieb. Domburg 16-7-1951, 4 exx. aan de wortels van *Sedum acre* L.

13. *Nysius punctipennis* H.S. (faun. nov. spec.) Domburg 14-7-1951, 1 ♂, 1 ♀; idem 5-8-1951, 1 ♂, 1 ♀. De soort bewoont hetzelfde dorre en warme biotoop als *Prostemma guttula* F. Uit de aangrenzende landen was zij reeds bekend.

14. *Chilacis typhae* Perr. Nisse (Zd. Beveland) 23-8-1951 en 16-9-1951, resp. 7 en 6 exx. in de kolven van *Typha angustifolia* L.

15. *Lasiosomus enervis* H.S. Oostkapelle 27-6-1949, 1 ex. geklopt van *Athyrium Filix-femina* Roth. Uit ons land was slechts 1 ex bekend, gevangen in Zd. Limburg.

16. *Emblethis verbasci* F. Domburg, Juli-Aug. 1951 in aantal in de duinen onder allerlei planten. Het type even algemeen als de z.g. „var.” *bul-lans* Put., welke laatste overigens door allerlei overgangen met het type verbonden is. Naast exx. met onverdikte zijrand van het halsschild (type), bezit ik exx. waarbij alleen het uiterste puntje van de voorhoeken verdikt is en exx. met geheel verdikte zijranden, met alle tussenvormen.

17. *Eremocoris podagricus* F. Oostkapelle 18-3-1950, 1 ex. tussen afgevallen eikenbladeren.

18. *Gastrodes grossipes* De G. is in de duinen bij Vrouwenpolder algemeen op aangeplante *Pinus*.

19. *Syromastes rhombeus* L. In de duinen bij Domburg (Juli-Aug. 1951) 15 exx., meestal op de grond, bij warm weer ook vliegend. Soms werden enkele imagines en larven bij elkaar aangetroffen.

20. *Stictopleurus abutilon* Rossi. Oostkapelle 11-10-1949, 1 ex. in de duinen van *Salix repens* L. geklopt. Voor zover mij bekend is dit de eerste vondst in het Westen van het land.

21. *Peribalus vernalis* Wlff. Oostkapelle 29-9-1949, 1 ex. van eik geklopt.

22. *Acanthosoma haemorrhoidale* L. Nieuw- en St. Joosland 15-10-1951, 1 ex. in een tuin op de grond lopend.

Nieuw- en St. Joosland, November 1951.

## Enige nieuwe en schaarse Diptera

door

Br. THEOWALD

### Therevidae:

*Thereva neglecta* Kröber (f.n.sp.). Alleen reeds door zijn grootte duidelijk van *T. bipunctata* Mg. te onderscheiden. Bekend uit M. en Z. Europa. Een exemplaar werd gevangen in de duinen van Vlieland. Dit is wel zeer noordelijk. Vlieland, 24-VII-1951, Br. THEOWALD.

### Syrphidae:

*Sphaerophoria menthastri* L. var. *dubia* Zett. Deze var. was in Nederland nog onbekend. Amersfoort, den Treek 8-VIII-1951, Br. THEOWALD.

*Melanostoma ambiguum* Fall. Van deze zeldzame soort werd een ♀ gevangen. Terschelling, Formerum, 15-VII-1950, Br. THEOWALD.

### Conopidae

*Leopoldia brevirostre* Germar (f.n.sp.). Het is de eerste maal, dat een soort uit dit genus in Nederland gevangen is. Deze soort is in heel Europa zeldzaam en slechts bekend uit Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Maastricht, 23-VIII-1950, Br. ARNOUD.

### Ephydriidae:

*Psilopa röderi* Girschner (f.n.sp.). Een van de weinige Ephydriidae met getekende vleugels. Gevangen in de duinen. Terschelling, Boschplaat, VIII-1951, P. F. v. HEERDT.

### Sphaeroceridae:

*Limosina (Paracollinella) Oldenbergi* Duda (f.n.sp.). Zou voorkomen in terreinen, waar konijnen huizen (RICHARDS). Twee exemplaren gevangen in het Salicornieto-Spartinetum. Terschelling, Boschplaat, 26-VII-1951, Br. THEOWALD.

### Anthomyidae:

*Eustalomyia histrio* Zett. (f.n.sp.). De larven van de verschillende soorten van dit genus leven in nesten van graafwespen. Ze voeden zich met het binnengesleepte voedsel. Eygelshoven, 23-VI-1951, Br. ARNOUD.

### Tachinidae:

*Miltogramma germari* Mg. (f.n.sp.). Volgens LUNDBECK leeft de larve als parasiet in nesten van *Podalirius bimaculatus* (Kramer). Zou vooral voorkomen in de zeeduinen. Terschelling, Kroonpolders, 15-VII-1950, Br. THEOWALD.

Amsterdam-Z. 1, Stadhouderskade 60, Maart 1952.

**Entomologische benodigdheden.** Ons medelid, de heer C. H. DIDDEN, Mr. v. Coothstraat 18, Waalwijk, treedt op als vertegenwoordiger van de firma REITTER te München, zodat de omslag van deviezenverklaringen etc. vermeden kan worden door bij hem te bestellen en met hem af te rekenen. — Lpk.