

Elachista holdenella Stt. In mijn verzameling bevindt zich een ♀ van een *Elachista*-soort, dat ik maar bij *nigrella* Hw. gezet had, hoewel ik steeds twijfelde aan de juistheid van de determinatie. Na nauwkeurig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen, dat het *E. holdenella* is, een in Duitsland, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk bekende soort. Er is een groot verschil in de stand en vorm van de tegenvlekken op de vvl. tussen *nigrella* en *holdenella*, terwijl de vleugels bij de laatste ook smaller en puntiger zijn. Het ex. werd tegelijk met *nigrella*-exx. uit gras gesleept op 28-V-1938 te Hilversum. De rups mineert in April de bladeren van *Aira*-species.

Elachista pulchella Hw. In Lambillionea 1949 : 119 heeft JANMOULLE aangetoond, dat *pulchella* een goede soort is, maar dat zij, behalve door PIERCE (*Genitalia Tineina*, p. 47, pl. 27, *obscura* Stt.) door niemand als zodanig herkend is en altijd voor *humilis* Z. werd gehouden. Na onderzoek der genitalia heb ik bemerkt, dat al mijn exx. van *humilis*, die ik bij Hilversum gevangen heb, *pulchella* zijn, terwijl *pulchella* juist de zeldzame soort in België is. Op de Sint Pietersberg komt echter bijna uitsluitend *humilis* voor, hetgeen bleek na onderzoek van meer dan 100 aldaar gevangen exx. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen, of *humilis* uitsluitend in het Zuiden des lands voorkomt, terwijl *pulchella* meer in het midden en Noorden wordt aangetroffen.

Hilversum, Diependaalse laan 286, April 1952.

Stenodema trispinosum Reut. (Hem.-Het.). Eind September 1952 vond ik op riet, groeiend op een opgespoten terrein in Zaandam, een tiental exemplaren van de wants *Stenodema trispinosum* Reut. Van de Heer BANK ontving ik begin October 1952 nog een tiental exemplaren, afkomstig van hetzelfde terrein.

Deze soort lijkt veel op de zeer algemene *Stenodema calcaratum* Fall., doch laat zich gemakkelijk onderscheiden door de doornen aan de achterdijen. Bij *trispinosum* staan n.l. de twee hoofddoorns veel verder uit elkaar dan bij *calcaratum*, terwijl *trispinosum* er nog een derde klein doorntje bij heeft.

Volgens een verslag van de 105e zomervergadering der Vereniging, gehouden op 17.VI.1950, werd door de heer GRAVESTEIN een exemplaar van deze soort getoond als f. nov. spec., gevangen door de Heer P. BRAKMAN in Nieuw en Sint Joosland op 11.VIII.1946. Dit schijnt tot nu toe de enige vindplaats te zijn geweest.

J. H. WOULDSTRA, Noordsche Bosch 13, Zaandam.

Biological Abstracts. De publicaties in onze uitgaven „Tijdschrift voor Entomologie” en „Entomologische Berichten” werden tot dusverre gerefereerd in het tijdschrift „Biological Abstracts”, door Dr H. C. BLÖTE en Dr C. O. VAN REGTEREN ALTENA. Daar beide heren echter door drukke werkzaamheden genoodzaakt zijn het samenstellen van deze uittreksels te beëindigen, wil het Bestuur gaarne weten of er onder de leden iemand is, die dit werk wil overnemen. Het is natuurlijk van veel belang, dat deze referaten worden voortgezet, aangezien hiermede tevens de aandacht op onze Vereniging wordt gevestigd.

De beloning voor het werk is niet in geld, doch bestaat uit een gratis abonnement op een van de series dezer uitgave.

Wie er op reflecteert, gelieve zich bij ondergetekende op te geven.

Haarlem, Floraplein 9, Sept. 1952.

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris.