

Macrolepidoptera van Vollenhove II

door

J. H. WINTERS Hz.

Toen ik vorige jaar mijn „Overzicht” schreef (zie Ent. Ber. 13 : 309), was ik van plan om op andere plaatsen dan tot nog toe in deze gemeente te gaan vangen. Helaas is hiervan niets gekomen door verandering van werkzaamheden. Een voordeel hiervan is echter, dat nu duidelijk blijkt, dat Vollenhove een rijke vlinderfauna herbergt, die de moeite van een nauwgezet onderzoek zeer zeker rechtvaardigt. In Marknesse heb ik geen enkele soort gevangen die in Vollenhove niet gevonden werd.

Dit overzicht is afgesloten op 1 Januari 1952.

Nymphalis io L. komt zeer algemeen voor.

Thecla quercus L. Een zwaar beschadigd ex. gevangen op eik.

T. betulae L. Dit jaar slechts enkele exx. gezien.

Celastrina argiolus L. Gen. I zeer talrijk op Landgoed „De Oldenhof”.

Pyrgus malvae L. In moerassen algemeen.

Dasychira fascelina L. Enkele exx. gevangen.

Gastropacha quercifolia L. In 1950 één ex., in 1951 twee exx.

Saturnia pavonia L. Evenals in 1950, wijfje gevangen op Adelaarsvaren. Het ex. legde ca. 60 eieren, die ook uitkwamen, doch de rupsjes stierven alle jong (vóór de 1e vervelling).

Nola cucullatella L. Een 10-tal exx. gevangen.

Roeselia albula Schiff. Zes exx. gevangen.

Lithosia quadra L. Eén ♂ gevangen.

Eilema sororcula Hufn. Een ex. aan een bosrand van hakhout in de schemering gevangen.

Coscinia cribraria L. Eén ex. gevangen, evenals van *Tyria jacobaeae* L.

Procris staticis L. Algemeen op drassig veenland.

Hepialus humuli L. Een ♀ in de schemering (eierlegend) gevangen.

Vloog op ongeveer 1,25 m boven de grond, langzaam en in rechte lijn.

Agrotis segetum Schiff. Eén ex. gevangen. *A. ypsilon* Rott. Een zestal exx. gevangen.

Diarsia mendica F. Op één avond drie exx. op licht. Daarna niet weer gezien.

Amathes triangulum Hufn. Eén ex. gevangen, evenals van *A. ditrapezium* Bkh.

Peridroma saucia Hb. Een tweetal exx. gevangen.

Lampra fimbriata Schreber. Eén ex. gevangen.

Panolis flammea Schiff. In dennenbos 1 pop gevonden, die in het voorjaar uitkwam..

Conistra vaccinii L. Enkele exx. op licht gevangen, tegelijk met *Anchoscelis helvola* L., *Agrochola lychnidis* Schiff., *A. lota* Cl. en *A. circellaris* Hufn.

Brachionycha sphinx Hufn. Eén ex. op licht.

Dryobota protea Schiff. Eén ex. op licht.

Allophyes oxyacanthae L. Eén ex. op stroop.

Lithophane semibrunnea Hw. Twee exx. gevangen.

Panemeria tenebrata Scop. Enkele exx. gevangen.

Chilodes maritima Tauscher. Eén ex. op licht.

Nonagria geminipuncta Hw. Eén ex. gevangen ; *N. typhae* Thunbg. twee exx. op licht.

Arenostola pygmina Hw. Eén ex. gevangen.

Procus strigilis L. Enkele exx. gevangen.

Amphipyra tragopoginis L. Eén ex. gevangen op licht, evenals van *Eustrotia uncula* Cl. en *Sarrothripus revayana* Scop.

Ectypa glyphica L. Vrij algemeen op dezelfde plaatsen als *Procris stacticis* L.

Abrostola tripartita Hufn. Eén ex. gevangen, evenals van *Laspeyria flexula* Schiff. en van *Zanclognatha grisealis* Schiff.

Van *Hypena rostralis* L. een tiental exx. gevangen.

Thalera fimbrialis Scop. en *Jodis lactearia* L. Eén ex. gevangen

Herminia barbalis Clerck. Eén ex. in 1950 gevangen door de heer A. VAN RANDEN.

Sterrha fuscovenosa Goeze en *S. seriata* Schrank enkele exx. gevangen.

Cosymbia porata L. Eén ex. bij een „walletje” uit lang gras opgejaagd.

Chesias legatella Schiff. Een vijftal exx. gevangen.

Acasis viretata Hb. Eén ex. gevangen.

Calocalpe undulata L. Een drietal exx. gevangen in de schemering, aan de rand van een hakbos.

Thera obeliscata Hb. Eén ex. op licht.

Dysstroma truncata Hufn. Enkele exx. gevangen.

Xanthorhoë montanata Schiff. Zeer algemeen opgejaagd uit braamstruiken.

Calostigia didymata L. Enkele exx. gevangen.

Hydriomena coerulata F. Een ex. gevangen.

Euchoeca nebulata Scop. Algemeen op het landgoed „De Oldenhof”, waar enkele bosbessen voorkomen.

Eupithecia absinthiata Clerck, *E. vulgata* Hw., *E. castigata* Hb., *E. succenturiata* L., *E. subnotata* Hb., in enkele exx. gevangen.

Calliclystis rectangulata L. Eén ex. gevangen.

Bapta bimaculata F. In de schemering bij de hakbosrand enkele exx. gevangen.

B. temerata Schiff. Eén ex. op dezelfde plaats.

Ourapteryx sambucaria L. Eén ex. op licht, evenals van *Plagodis dolabraria* L.

Cepphis advenaria Hb. Gewoon in hakbos in de buurt van Adelaarsvaren en Hop, bovendien op dezelfde plaats als *Euchoeca nebulata* Scop.

Semiothisa clathrata L. Eén ex. in 1951 gevangen door de heer J. VAN BENTHEM.

Erannis leucophaearia Schiff. Gewoon.

Bupalus piniarius L. Eén ex. uit een in het dennenbos gevonden pop.

Bena prasinana L. Eén ex. op licht.

Vollenhove, Januari 1952 (Tegenwoordig adres : RR 3, Mitchell, Ont., Canada).

De *Yponomeuta* van de Kardinaalsmuts. De Heer BENTINCK was zo vriendelijk er mijn aandacht op te vestigen, dat dit niet *Y. evonymellus* L. is, maar *Y. cognatellus* Hb. De eerste soort leeft op *Prunus padus* L. — Lpk.