

*Nonagria geminipuncta* Hw. Eén ex. gevangen ; *N. typhae* Thunbg. twee exx. op licht.

*Arenostola pygmina* Hw. Eén ex. gevangen.

*Procus strigilis* L. Enkele exx. gevangen.

*Amphipyra tragopoginis* L. Eén ex. gevangen op licht, evenals van *Eustrotia uncula* Cl. en *Sarrothripus revayana* Scop.

*Ectypa glyphica* L. Vrij algemeen op dezelfde plaatsen als *Procris stacticis* L.

*Abrostola tripartita* Hufn. Eén ex. gevangen, evenals van *Laspeyria flexula* Schiff. en van *Zanclognatha grisealis* Schiff.

Van *Hypena rostralis* L. een tiental exx. gevangen.

*Thalera fimbrialis* Scop. en *Jodis lactearia* L. Eén ex. gevangen

*Herminia barbalis* Clerck. Eén ex. in 1950 gevangen door de heer A. VAN RANDEN.

*Sterrha fuscovenosa* Goeze en *S. seriata* Schrank enkele exx. gevangen.

*Cosymbia porata* L. Eén ex. bij een „walletje” uit lang gras opgejaagd.

*Chesias legatella* Schiff. Een vijftal exx. gevangen.

*Acasis viretata* Hb. Eén ex. gevangen.

*Calocalpe undulata* L. Een drietal exx. gevangen in de schemering, aan de rand van een hakbos.

*Thera obeliscata* Hb. Eén ex. op licht.

*Dysstroma truncata* Hufn. Enkele exx. gevangen.

*Xanthorhoë montanata* Schiff. Zeer algemeen opgejaagd uit braamstruiken.

*Calostigia didymata* L. Enkele exx. gevangen.

*Hydriomena coerulea* F. Een ex. gevangen.

*Euchoeca nebulata* Scop. Algemeen op het landgoed „De Oldenhof”, waar enkele bosbessen voorkomen.

*Eupithecia absinthiata* Clerck, *E. vulgata* Hw., *E. castigata* Hb., *E. succenturiata* L., *E. subnotata* Hb., in enkele exx. gevangen.

*Calliclystis rectangulata* L. Eén ex. gevangen.

*Bapta bimaculata* F. In de schemering bij de hakbosrand enkele exx. gevangen.

*B. temerata* Schiff. Eén ex. op dezelfde plaats.

*Ourapteryx sambucaria* L. Eén ex. op licht, evenals van *Plagodis dolabraria* L.

*Cepphis advenaria* Hb. Gewoon in hakbos in de buurt van Adelaarsvaren en Hop, bovendien op dezelfde plaats als *Euchoeca nebulata* Scop.

*Semiothisa clathrata* L. Eén ex. in 1951 gevangen door de heer J. VAN BENTHEM.

*Erannis leucophaearia* Schiff. Gewoon.

*Bupalus piniarius* L. Eén ex. uit een in het dennenbos gevonden pop.

*Bena prasinana* L. Eén ex. op licht.

Vollenhove, Januari 1952 (Tegenwoordig adres : RR 3, Mitchell, Ont., Canada).

---

De *Yponomeuta* van de Kardinaalsmuts. De Heer BENTINCK was zo vriendelijk er mijn aandacht op te vestigen, dat dit niet *Y. evonymellus* L. is, maar *Y. cognatellus* Hb. De eerste soort leeft op *Prunus padus* L. — Lpk.