

Coleopterologische Notities IV

door

C. DE JONG

Het door de Heer E. A. M. SPEIJER in 1943 te Barneveld op „de Schaffelaar” verzamelde Coccinelliden-materiaal, dat destijds naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden is gezonden, bleek bij nadere bestudering een groot aantal aberraties van enige algemene soorten te bevatten, die in het Museum nog niet in de verzameling vertegenwoordigd waren. Deze vormen zijn met een sterretje aangegeven. Bij de determinatie der vormen werd o.a. gebruik gemaakt van een aantal aantekeningen van wijlen Dr Ed. EVERTS, alsook van het werk van Leopold MADER: Evidenz der paläarktischen Coccinelliden und ihrer Aberrationen in Wort und Bild (1926—1937, Zeitschr. Ver. Naturbeob. u. Sammler, Entom. Anz. en Entom. Nachr. Blatt.), welke mij door de Heer VAN DER WIEL welwillend ten gebruike zijn gegeven, waarvoor hier mijn dank.

De volgorde der soorten is volgens EVERTS, 1925, Nieuwe Naamlijst Coleoptera Neerlandica, die der aberraties is volgens MADER.

Chilocorini.

Exochomus quadripustulatus L. 29 exx. III. en IV.1943.

Coccinellini.

Aphidecta oblitterata L. ab. 6-notata Thbg. 1 ex. 17.III.1943.

Anisosticta novemdecimpunctata L. 1 ex. 6—17.V.1943, 1 ex. 18—25.V.1943.

Coccinella septempunctata L. 2 exx. IV.1943, 8 exx. begin VI.1943.

Coccinella distincta Fald. 1 ex. 15—19.IV.1943.

Coccinella quinquepunctata L. 17 exx. III—IV.1943.

Coccinella (Adalia) bipunctata L. 14 exx. 2.III.1943.

ab. *bioculata* Sajò, 15 exx. 2.III.1943.

ab. *pruni* Weise, 3 exx. 1.III.1943.

*ab. *sesquipunctata* Harr., 11 exx. 2.III.1943.

*ab. *rubiginosa* Weise, 1 ex. 1.III.1943.

ab. *inaequalis* Weise, 1 ex. 1.III.1943.

*ab. *polyguttata* Meier, 2 exx. 2.III.1943.

ab. *sexpustulata* L., 18 exx. 1—7.III.1943.

*ab. *interrupta* Meier, 1 ex. 2.III.1943.

ab. *quadrinaculata* Scop., 21 exx. III.1943.

*ab. *lineatoides* Mader, 1 ex. 2.III.1943.

*ab. *lugubris* Weise, 2 exx. 2.III.1943.

Coccinella (Adalia) decempunctata L. 10 exx. III—IV.1943.

ab. *lutea* Rossi, 2 exx. III.1943.

ab. *subpunctata* Schal., 1 ex. 22.III.1943.

ab. *quadripunctata* L., 1 ex. III.1943.

ab. *octopunctata* Müll., 1 ex. IV.1943.

ab. *guttatopunctata* L., 4 exx. III.1943.

ab. *bimaculata* Pontopp., 3 exx. III—IV.1943.

Coccinella (Synharmonia) conglobata L. 13 exx. III.1943, 1 ex. IV.1943.

ab. *mülleri* Lesm., 1 ex. 1.III.1943.

*ab. *gammeli* Mader, 1 ex. 1.III.1943.

- ab. *gratschi* Mader, 15 exx. 2.III.1943.
- ab. *meridionalis* Müller, 28 exx. III.1943.
- *ab. *formosa* Müller, 2 exx. 2.III.1943.
- ab. *pruni* Mader, 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *maderi* Lem., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *walteri* Lem., 1 exx. 26—31.V.1943, 2 exx. 2.III.1943.
- *ab. *depoli* Lem., 3 exx. 2.III.1943.
- *ab. *marrineri* Lem., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *intermedia* Dep., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *suturalis* Dep., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *pazzini* Dep., 2 exx. 2.III.1943.
- *ab. *lecontei* Lem., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *weisei* Mader, 1 ex. 7.III.1943.
- *ab. *heydeni* Lem., 1 ex. 2.III.1943.
- ab. *della beffai* Dep., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *circulata* Mader, 4 exx. 2.III.1943.
- *ab. *evertsi* Lem., 2 exx. 2.III.1943.
- ab. *faldermanni* Lem., 1 ex. 2.III.1943.
- *ab. *schneideri* Lem., 6 exx. III.1943.
- *ab. *multiconjuncta* Dep., 7 exx. 2.III.1943.
- *ab. *zetterstedti* Lem., 1 ex. 9.III.1943.
- *ab. *X-signata* Grundm., 1 ex. 2.III.1943.
- Anatis ocellata* L. 2 exx. 7.III.1943 en 18—25.V.1943.
- *ab. *bivittata* Wse., 1 ex. 15.V.1943.

Dit exemplaar voldoet aan de vlekformule, zoals deze wordt opgegeven voor *composita* Hm. (MADER, p. 275, pl. 53, fig. 10): 1, 2, 3 + 4, 5, 6, 7 + 10, 8, 9, waarbij moet worden opgemerkt, dat 7 + 10 hier geen volledige versmelting is, doch de vlekken benaderen elkaar. Verder is de top van de schilden zwart en de zwarte zijrand is ter hoogte van 7 iets verbreed (door MADER als m aangeduid). Door MADER worden 8 verschillende vlekpatronen, waaronder ook *composita* Hm., samengevat als ab. *bivittata* Wse.

Halysia sedecimguttata L. 22 exx. III—IV.1943.

Propylaea quatuordecimpunctata L. 3 exx. III—IV.1943.

- *ab. *suturalis* Dep. 1 ex. 15—19.IV.1943.
- ab. *sejugata* Mader, 1 ex. 13—17.VI.1943.
- ab. *palustris* Sajò, 1 ex. 8—17.V.1943.
- *ab. *kanabei* Mader, 1 ex. 15—19.IV.1943.
- ab. *weisei* Mader, 6 exx. IV—VI.1943.
- *ab. *agglutinata* Mader, 1 ex. 15—19.IV.1943.
- *ab. *grundmanni* Mader, 1 ex. 15—19.IV.1943.
- ab. *pannonica* Sajò, 21 exx. V—VI.1943.
- ab. *conglomerata* F., 6 exx. IV—VI.1943.
- ab. *contenta* Mader, 2 exx. 14.IV.1943.
- *ab. *frivaldskyi* Sajò, 2 exx. IV en V.1943.
- ab. *beffai* Mader, 1 ex. 8—17.V.1943.
- ab. *leopardina* Weise, 5 exx. V—VI.1943.
- ab. *12-pustulata* Pontopp., 6 exx. III—VI.1943.
- *ab. *perlata* Weise, 1 ex. 22.III.1943.

Summary

In the present paper an enumeration is given of the Coccinellids, collected by Dr E. A. M. SPEIJER during his involuntary stay at Barneveld (Holland) in 1943. This collection comprises many forms new for the Leiden Collection, which are marked with an asterisk.

Bilthoven, Bilderdijklaan 69, 27 Dec. 1952.

Enige korte notities over 1952. Dit jaar is voor mij geen slecht vlinderjaar geweest. De algemene soorten vlogen volop en vele vormen heb ik gevangen. Slechts de meest belangrijke deel ik in de hieronder volgende lijst mee.

Pieris brassicae L. 1 ♂ f. *nigronotata* Jach., Amsterdam, 22.V; 2 ♂ ♂ van de derde generatie, Amsterdam, 15.X.

Pieris rapae L. 1 ♂, waarbij de onderkant der achtervleugels zeer sterk zwart bestoven is, Amsterdam, 14.IV; 1 ♀ f. *minima* Verity, Amsterdam, 23.VIII.

Pieris napi L. Uit een a.o. kweek (eerste gen.) verkreeg ik enkele ♀ ♀, waarbij, op de bovenkant der voorvls. de donkere tekening uitgebreid is en ♀ ♀ met een lichtokerkleurige grondkleur.

1 ♂ f. *marginestixis* Dannehl, Nijetrijne (Fr.), 6.VII. Dit ex. vertoont deze afwijking zeer duidelijk, wat bij ♂ ♂ een grote zeldzaamheid is.

Vanessa atalanta L. 1 ♀, pathol. ex.: de rode band op de rechter a.vl. gedeeltelijk verbleekt. Amsterdam, 9.IX.

Vanessa cardui L. 1 ♂ f. *septiespupillata* Verity, Amsterdam, 13.VI; 1 ♂ f. *sexiespupillata* Verity, Veenhuizen (Dr.), 2.VII.

Melitaea athalia Rott. 1 pathol. ex., waarbij de voorvleugels grotendeels verbleekt zijn. Norg, 3.VII.

Hipparchia semele L. 1 ♀ f. *addenda* Tutt. Egmond aan Zee, 21.VII.

Lasiommata megera L. 1 ♀, apicaal oog op de bovenkant van de rechter v.vl. is zeer klein, Amsterdam, 14.VIII.

Maniola jurtina L. 1 ♂ f. *nana* Stephan. Norg, 1.VII. Bovendien zijn de apicaal-ogen aan de onderzijde dubbel gekernd. f. *bioculata* Rekel,

1 ♂ f. *bioculata* Rebel. Amsterdam, 13.VI. Slechts het apicaal-oog op de linker v.vl. is, op de boven- en onderzijde, dubbel gekernd.

1 ♂ f. *addenda* Mousley. Dit ♂ heeft in de anaal-hoek der a.vls. een oogje. De corresponderende oogjes aan de onderzijde zijn gekernd; f. *infra-pupillata* Lempke. Amsterdam, 13-VI.

Het reeds bovengenoemde ♂, f. *nana* Stephan, heeft op de linker a.vl. bovenkant 2 zwarte oogjes.

Pathol. exx.: 2 ♂ ♂ met verbleekte rechter a.vl. Amsterdam, 13 en 16.VI.

Coenonympha pamphilus L. 2 ♂ ♂ f. *nosalica* Prüffer. Amsterdam, 5.VI, en Donderen, 30.VI; 1 pathol. ♀ dat, symmetrisch, op de boven- en onderzijde der v.vls. lichte vlekken heeft, Amsterdam, 24.VI.

Coenonympha tullia Müller. 2 exx. f. *addenda* Lpk. 1 ♀ Donderen (Lange Aarveen), 1.VII en 1 ♂, Norg, 29.VI; 1 ♂ met slechts 1 ocel op de onderzijde der v.vls., Donderen, 30.VI.

Lycaena phlaeas L. 1 ♂ f. *basilipuncta* Tutt. Amsterdam, 11.VII. Bovendien 2 extra vlekjes tussen de middencelvlak en de bovenste submarginale vlekken.

Polyommatus icarus Rott. 1 ♂ ex., dat een overgang vormt naar f. *nigromaculata* Ckll., Amsterdam, 22.VII; 3 exx. van de derde gen., één ♀ en twee ♂ ♂, Amsterdam, 15.IX.

H. J. L. T. STAMMESHAUS, Grensstraat 15, Amsterdam-O.