

Summary

In the present paper an enumeration is given of the Coccinellids, collected by Dr E. A. M. SPEIJER during his involuntary stay at Barneveld (Holland) in 1943. This collection comprises many forms new for the Leiden Collection, which are marked with an asterisk.

Bilthoven, Bilderdijklaan 69, 27 Dec. 1952.

Enige korte notities over 1952. Dit jaar is voor mij geen slecht vlinderjaar geweest. De algemene soorten vlogen volop en vele vormen heb ik gevangen. Slechts de meest belangrijke deel ik in de hieronder volgende lijst mee.

Pieris brassicae L. 1 ♂ f. *nigronotata* Jach., Amsterdam, 22.V; 2 ♂ ♂ van de derde generatie, Amsterdam, 15.X.

Pieris rapae L. 1 ♂, waarbij de onderkant der achtervleugels zeer sterk zwart bestoven is, Amsterdam, 14.IV; 1 ♀ f. *minima* Verity, Amsterdam, 23.VIII.

Pieris napi L. Uit een a.o. kweek (eerste gen.) verkreeg ik enkele ♀ ♀, waarbij, op de bovenkant der voorvls. de donkere tekening uitgebreid is en ♀ ♀ met een lichtokerkleurige grondkleur.

1 ♂ f. *marginestixis* Dannehl, Nijetrijne (Fr.), 6.VII. Dit ex. vertoont deze afwijking zeer duidelijk, wat bij ♂ ♂ een grote zeldzaamheid is.

Vanessa atalanta L. 1 ♀, pathol. ex.: de rode band op de rechter a.vl. gedeeltelijk verbleekt. Amsterdam, 9.IX.

Vanessa cardui L. 1 ♂ f. *septiespupillata* Verity, Amsterdam, 13.VI; 1 ♂ f. *sexiespupillata* Verity, Veenhuizen (Dr.), 2.VII.

Melitaea athalia Rott. 1 pathol. ex., waarbij de voorvleugels grotendeels verbleekt zijn. Norg, 3.VII.

Hipparchia semele L. 1 ♀ f. *addenda* Tutt. Egmond aan Zee, 21.VII.

Lasiommata megera L. 1 ♀, apicaal oog op de bovenkant van de rechter v.vl. is zeer klein, Amsterdam, 14.VIII.

Maniola jurtina L. 1 ♂ f. *nana* Stephan. Norg, 1.VII. Bovendien zijn de apicaal-ogen aan de onderzijde dubbel gekernd. f. *bioculata* Rekel,

1 ♂ f. *bioculata* Rebel. Amsterdam, 13.VI. Slechts het apicaal-oog op de linker v.vl. is, op de boven- en onderzijde, dubbel gekernd.

1 ♂ f. *addenda* Mousley. Dit ♂ heeft in de anaal-hoek der a.vls. een oogje. De corresponderende oogjes aan de onderzijde zijn gekernd; f. *infra-pupillata* Lempke. Amsterdam, 13-VI.

Het reeds bovengenoemde ♂, f. *nana* Stephan, heeft op de linker a.vl. bovenkant 2 zwarte oogjes.

Pathol. exx.: 2 ♂ ♂ met verbleekte rechter a.vl. Amsterdam, 13 en 16.VI.

Coenonympha pamphilus L. 2 ♂ ♂ f. *nosalica* Prüffer. Amsterdam, 5.VI, en Donderen, 30.VI; 1 pathol. ♀ dat, symmetrisch, op de boven- en onderzijde der v.vls. lichte vlekken heeft, Amsterdam, 24.VI.

Coenonympha tullia Müller. 2 exx. f. *addenda* Lpk. 1 ♀ Donderen (Lange Aarveen), 1.VII en 1 ♂, Norg, 29.VI; 1 ♂ met slechts 1 ocel op de onderzijde der v.vls., Donderen, 30.VI.

Lycaena phlaeas L. 1 ♂ f. *basilipuncta* Tutt. Amsterdam, 11.VII. Bovendien 2 extra vlekjes tussen de middencelvlak en de bovenste submarginale vlekken.

Polyommatus icarus Rott. 1 ♂ ex., dat een overgang vormt naar f. *nigromaculata* Ckll., Amsterdam, 22.VII; 3 exx. van de derde gen., één ♀ en twee ♂ ♂, Amsterdam, 15.IX.

H. J. L. T. STAMMESHAUS, Grensstraat 15, Amsterdam-O.