


Literatuur

Zandvliet, H., Loopkevertabel. Uitgave van de Insectencommissie der N.J.N., 1953. Prijs f 0,50. Bestellen bij J. DE SMIDT, Veldlaan 16, Groenekan, giro no. 233040.

De heer LEMPKE zond mij bovengenoemd werkje ter recensie. In de eerste plaats deed het mij genoeg dat bij de serie van insecten-tabellen der N.J.N. thans een tabel over een kever-familie verscheen. Inderdaad was dat hard nodig, aan de kevers is de laatste jaren veel te weinig aandacht besteed.

Het werkje ziet er fris uit en de bijgevoegde tekeningen zullen er zeker toe bijdragen om tot een juiste determinatie te komen. Vanzelfsprekend is het onmogelijk om in 36 bladzijden alle loopkevers op te nemen, doch de keuze is in 't algemeen vrij gelukkig. Van de zeldzamere soorten zijn ook de opvallende vermeld. Iemand, die pas begint zich met de kevers bezig te houden, zal nog wel moeite hebben met deze beknopte tabel tot zekere determinatie te komen. Inderdaad is het gewenst de dieren nog ter contrôle te zenden. Bij het groeien der verzameling wordt het determineren gemakkelijker, men kan dan de dieren zelf vergelijken.

Bij de literatuuropgave zouden nog toegevoegd kunnen worden de vlot geschreven boekjes van Dr A. RECLAIRE: Kevers I, II en III, uit de serie „Wat leeft en groeit”, Deel 15, 16 en 17, 1951, Uitgeverij „Het Spectrum” te Utrecht. — P. VAN DER WIEL.



Syrphidae, nieuw voor Vlieland en Terschelling. Naar aanleiding van de mededeling over Syrphidae van de heer P. H. VAN DOESBURG Sr. zou ik willen opmerken, dat ik *Pelecocera tricincta* Mg. ook op Terschelling ving: mannetje en wijfje 15.VII. 1950. Ze kwam vrij regelmatig in het dennenbos bij Formerum voor. SACK vermeldt de soort uit dennenbossen van de laagvlakte van geheel Europa.

Met *Pelecocera tricincta* Mg. verzamelde ik in 1950 en 1951 31 Syrphiden-soorten van Terschelling, waaronder enkele nieuw voor dit eiland: *Paragus tibialis* Fall. en *Chrysotoxum bicinctum* L. in Juli 1950 en *Chilosia vernalis* Fall., *Chilosia scutellata* Fall., *Neoascia podagrica* F., *Platychirus manicatus* Mg. en *Baccha elongata* F. in Augustus 1951.

Bijzonder was voorts de vondst van één wijfje *Melanostoma ambiguum* Fall., 15.VII. 1950, welke soort als zeer zeldzaam te boek staat, maar vermoedelijk veel over het hoofd gezien wordt. Deze soort was al van Terschelling bekend.

Op een ééndaagse excursie naar Vlieland werden 11 Syrphidensoorten verzameld, waaronder twee, welke nog niet vermeld waren van dit eiland, t.w. *Epistrophe auricollis* Mg. en *Eristalis pratorum* Mg. Beiden in Juli 1950.

V. v. D. GOOT, Niersstraat 10III, Amsterdam-Z. 2.

Aethes williana Brahm, 1791 (Lep., Tortricidae) (*Conchylis zephyrana* Treitschke, 1830, in de Naamlijst van LYCKLAMA à NIJEHOLT, p. 8, no. 1732, 1927). In Ent. Z. Frankfurt, vol. 61, p. 182, 1952, toont de „Tortricidoloog” N. S. OBRATZTSOV aan, dat onder deze naam twee soorten schuilen. Volgens de door hem opgegeven vindplaatsen zouden beide in ons land kunnen voorkomen.

Voor zover ik kon nagaan, is echter tot nu toe alleen *A. williana* (met ongevlekte voorvleugelranje) hier aangetroffen. De heer BENTINCK deelde mij mee, dat hij er een paar exx. van bezit. Verder zijn in het Rijks Mus. v. Natuurl. Historie te Leiden negen exx. van Breda (HEYLAERTS leg.). De coll.-DOETS bevat geen materiaal van de soort, evenmin het Zoöl. Mus. te Amsterdam. Blijkbaar is het geen gewone soort in Nederland!

Van *A. margarotana* Duponchel, waarbij de ranje der voorvls. tot het uiteinde gevlekt is, ontbreekt tot nog toe dus elk spoor bij ons. — Lpk.