

595,706492
E 61
INSECTS

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING

No. 341

Deel XIV

1 Nov. 1953

Adres der Redactie :

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12^{III}, Amsterdam-Zuid 2 — Nederland

INHOUD: **W. M. Docters van Leeuwen**: De Zoöcecidia van het eiland Texel (p. 373). — **Jiri Paclt**: Polychrosis vitisana (Jacq. 1788) comb. nov., or new synonymy in an important pest of the grape-vine (Lepidoptera Tortricidae) (p. 379). — **W. Roepke**: Cerosipha verbasci Schrk., een zeldzame bladluis, nieuw voor de fauna van Nederland (p. 380). — **W. Roepke**: Dr Carl Börner † (p. 381). — **G. Kruseman**: Note on Bombus jonellus (Kirby) (p. 382). — **P. F. van Heerdt**: The variability of the male common Earwig, Forficula auricularia L. (Dermapt.) (p. 383). — **V. Gerris**: Drinkende Apatura iris L. (p. 386). — **G. L. van Eyndhoven**: Verslag van de 12e Herfstvergadering te Amsterdam (p. 387). — Literatuur: (p. 387: **R. H. Cobben**). — Korte mededelingen: (p. 379: **Mededeling**; p. 382, **Correcties**; p. 385, **W. J. Boer Leffef**; p. 388: **C. J. Verhey**, **B. J. Lempke**).

De Zoöcecidia van het eiland Texel

door

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN

De gallen van de andere Waddeneilanden zijn reeds beschreven. Tot nu toe was ik er niet toe gekomen, een dergelijk onderzoek naar de gallen van het grootste eiland Texel in te stellen. Doch in de maand Juni 1952 genoot ik gedurende een week de gastvrijheid in het voorkamp van het kinderkamp „de Bremakker” van de Heer H. ALTA. Ik had zodoende de gelegenheid het duingebied goed te doorzoeken en met de Heer ALTA maakte ik een tocht per motorfiets naar meer afgelegen gedeelten van het eiland. In 1933 had ik gedurende een dag in het Zuidelijk duingebied verzameld en de Heer ALTA bracht in 1950 een flinke collectie gallen bijeen. Ook bezit ik in mijn collectie nog enkele gallen door anderen verzameld. Het duingebied is nu behoorlijk afgezocht, op de bewoonde en gecultiveerde plaatsen zal nog wel wat in te zamelen zijn.

Het is jammer, dat evenals op Vlieland ook op Texel de duinflora sterk door konijnen wordt afgevreten. Vele duinhellingen waren kaalgeschoren en zelfs de sterk gewapende duinroos was erg beschadigd. De op de oostelijk gelegen eilanden zo algemene Hieracium umbellatum was vrijwel afwezig en Galium verum was op vele plaatsen tot de grond toe afgegraasd. Op een bord in het Natuurmonument stond „verboden bloemen te plukken”. Doch er waren geen bloemen, trouwens de badgasten kunnen gedurende de vacantiemaanden nooit zoveel schade aanrichten als de konijnen gedurende het gehele jaar. Ook schapen droegen bij tot de vernieling van de plantengroei.

In het geheel werden 50 gallen op duin- en strandplanten bijeengebracht. Dat is een behoorlijk aantal, daar ik op Terschelling 45 van deze gallen verzameld heb. Opvallend was het ontbreken van de gal van *Lipara lucens* op het gewone riet, daar deze gal op alle eilanden behalve op Vlieland in de duinpannen voorkomt. Ook de gal van *Rhabdophaga jaapi* op Salix repens was zeer schaars. Maar ook deze plant had van konijnenvraat te lijden.

DIV. INS.
U.S. NATL. MUS.



NOV 2 2 1953

Op de berk vond ik een nieuwe gal, zie no. 78. Het was mijn bedoeling ook het kleine eiland Rottumeroog in dit onderzoek te betrekken. Van de Directeur van de Rijkswaterstaat in Groningen ontving ik toestemming het eiland te bezoeken, doch het is mij niet gelukt een weg tot het eiland te vinden.

Helaas zijn weer enkele naamsveranderingen onder de bladwespen, die gallen veroorzaken, noodzakelijk. Op *Salix repens* komen op de onderzijde van de bladeren twee ronde, rode gallen voor, ten dele behaard en ten dele onbehaard. Deze werden beschouwd als te zijn veroorzaakt door twee soorten bladwespen, resp. *Pontania pedunculi* Htg. en *P. viminalis* L. De Heer R. B. BENSON, die deze dieren bewerkt, schreef mij, dat beide gallen door één soort bladwesp worden gevormd. De Heer H. ALTA verzamelde een groot aantal gallen voor mij en begin Mei van dit jaar verschenen daaruit meer dan 40 wespen. De Heer BENSON deelde mij over deze dieren mede, dat zij zonder uitzondering tot één soort behoorden, nl. tot *Pontania collactanea* Först.

De gal no. 86 op *Salix cinerea* zal ook wel niet door *Pontania pedunculi* veroorzaakt worden. Voorlopig handhaaf ik de naam nog, de dieren zullen eerst gekweekt moeten worden, voor zekerheid kan worden verkregen, doch dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Hieronder volgt de lijst van de gevonden gallen. Achter de naam van de galvormer staat tussen () het nummer, waaronder de betreffende gal in het Gallenboek te vinden is. Daar vindt men een meer uitvoerige beschrijving. Achter de naam van de plant staat tussen () de naam van de vinder, A. = H. ALTA en D. v. L. = W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN.

Phytoptidae

1. *Epitrimerus trilobus* Nal. (751), blaadjes smaller en bovenwaarts opgerold, en vaak geelachtig bij *Sambucus nigra* L. (D. v. L.).
2. *Phyllocoptes anthobius* Nal. (293), dicht op elkaar zittende en sterk vergroende bloemen bij *Galium verum* L. (D. v. L.).
3. *Phyllocoptes scutellariae* Can. et Mass. (773), witte of violette haarbekledingen op vele organen van *Scutellaria galericulata* L. (D. v. L.).
4. *Phytoptus aceris* Kltb. var. *typicus* Nal. (25), rode hoorngalletjes op de bovenzijde van de bladeren bij *Acer Pseudo-platanus* L. (A., D. v. L.).
5. *Phytoptus brevirostris* Nal. (471), vergroening van de bloemen van *Polygala vulgaris* L. (A.).
6. *Phytoptus brevitorsus* Nal. var. *typicus* Nal. (64), witte, later bruine erineae aan de onderzijde van de bladeren van *Alnus glutinosa* Gaertn. (D. v. L.).
7. *Phytoptus cladophthirus* Nal. (808), bloemvergroening met heksenbezemvorming bij *Solanum Dulcamara* L. (A.).
8. *Phytoptus empetri* Lindr. (208), heksenbezemachtige woekeringen bij *Empetrum nigrum* L. (J. E. ROMBOUTS).
9. *Phytoptus enanthus* Nal. (339), bloemvergroening bij *Jasione montana* L. (D. v. L.).
10. *Phytoptus galii* Karp. (285), opgerolde bladeren bij *Galium verum* L. (D. v. L.).
11. *Phytoptus galiobius* Can. (284, 291), peervormige gallen aan het

- eind van de takken en in de bloeiwijzen van *Galium verum* L. (A., D. v. L.).
12. *Phytoptus goniothorax* Nal. var. *typicus* Nal. (176), nauwe, lichtgekleurde bladrandrollingen bij *Crataegus species* (D. v. L.).
 13. *Phytoptus hippophaëus* Nal. (326), zakvormige uitstulpingen van de bladeren bij *Hippophaë rhamnoides* L. (D. v. L.).
 14. *Phytoptus laevis* Nal. var. *lissonotus* Nal. (108), aan de onderkant van de bladeren rondachtige haarplekken, aan de bovenkant vlakke blazen bij *Betula alba* L. (D. v. L.).
 15. *Phytoptus laevis* Nal. var. *inangulus* Nal. (62), kleine, geelachtige knobbels langs de hoofdnerf bij *Alnus glutinosa* Gaertn. (A., D. v. L.).
 16. *Phytoptus laevis* Nal. var. *typicus* Nal. (63), rondachtige, rode hoorngallen op de bovenzijde van de bladeren bij *Alnus glutinosa* Gaertn. (A., D. v. L.).
 17. *Phytoptus lioproctus* Nal. (781), bladeren aan het eind van de stengel dicht op elkaar en sterk, wit behaard bij *Senecio Jacobaea* L. (A.).
 18. *Phytoptus macrochelus* Nal. var. *pseudoplatani* Corti (27), onregelmatige, afgeronde, witte haarplekken aan de onderkant van de bladeren bij *Acer Pseudo-platanus* L. (D. v. L.).
 19. *Phytoptus megacerus* Can. et Mass. (414), sterk behaarde toppen en bloemvergroening bij *Mentha aquatica* L. (D. v. L.).
 20. *Phytoptus piri* Westw. var. *sorbi* Nal. (813), pokken op de bladeren van *Sorbus aucuparia* L. (A.).
 21. *Phytoptus piri* Westw. var. *typicus* Nal. (542), pokken op de bladeren van *Pyrus communis* L. (D. v. L.).
 22. *Phytoptus plicator* Nal. (424), bloemen en einden van de takken veranderd in kluwens van takjes en blaadjes bij *Ornithopus perpusillus* L. (D. v. L.).
 23. *Phytoptus rudis* Nal. var. *blastocoptes* Rtz. (99), vergrote en losere knoppen van *Betula alba* L. (A., D. v. L.).
 24. *Phytoptus tetanothrix* Nal. var. *craspedobius typicus* Nal. (698), korte rollingen van de bladrand bij *Salix alba* L. (D. v. L.).
 25. *Phytoptus iteinus* Nal. (723), 1—2 mm grote knobbeltjes op de bovenzijde van de bladeren bij *Salix aurita* L. (A.).
 26. *Phytopside* (206), vergroening van de bloemen bij *Drosera rotundifolia* L. (In 1895 door H. C. REDEKE gevonden).
 27. *Phytopside* (294), bloemen min of meer vergroend, assen van de bloeiwijzen onverkort bij *Galium verum* L. (D. v. L.).
 28. *Phytopside* (746), rode bladrandgalletjes en speldeknoopgrote buidelgalletjes op de bladeren van *Salix repens* L. (A., D. v. L.).

T h e r i s m o p t i d a e

29. *Therismoptes phragmitidis* Schlcht. (439), bladeren gedraaid en gezwollen, bedekt met knopvormige haren bij *Phragmites communis* Trin. (A., D. v. L.).

H o m o p t e r a

30. *Doralis ruborum* Börner (672), proppen van ineengerolde bladeren bij *Rubus fruticosus* L. (A.).

31. *Doralis rumicis* L. (682), onregelmatige in de lengte benedenwaarts gerolde bladeren bij *Rumex obtusifolius* L. (D. v. L.).
32. *Doralis urticata* Gmelin. (901), proppen van benedenwaarts gerolde bladeren bij *Urtica dioica* L. (D. v. L.).
33. *Hayhurstia atriplicis* L. (89), verkleurde bladrandrollingen bij *Atriplex hastata* L. (A.) en *A. littoreus* L. (D. v. L.).
34. *Hayhurstia atriplicis* L. (154), gele bladrandrollingen bij *Chenopodium album* L. (A.).
35. *Hyadaphis foeniculi* Pass. (368, 369), bloemvergroening en bovenwaarts gerolde, slappe bladeren bij *Lonicera Periclymenum* L. (A., D. v. L.).
36. *Hydaphias bicolor* Kltb. (295), bloemen in dichte proppen, min of meer vergroend bij *Galium verum* L. (D. v. L.).
37. *Sacchiphantes abietis* L. (444), ananasgal aan de bases van de takken bij *Picea Abies* Karst. (A.).
38. *Aphidide* (223), bovenwaarts gerolde en gekroesde bladeren bij *Eryngium maritimum* L. (A.).
39. *Philaenus spumarius* L. (753), bladeren dicht op elkaar, gekroesd en gerold bij *Sambucus nigra* L. (A., D. v. L.).
40. *Livia juncorum* Lah. (341), bezemachtige, rode bladgallen bij *Juncus anceps* Latr. var. *atricapillus* Buck. (A. MEEUSE) en bij *J. articulatus* L. (D. v. L.).
41. *Trioza galii* Först. (279), rondachtige, gele of roze bladrozetten, vaak aan de knoppen van de wortelstok bij *Galium verum* L. (D. v. L.).

Coleoptera

42. *Apion sanguineum* Deg. (678), afgeronde, lichtbruine opzwellingen aan de wortelhals van *Rumex acetosella* L. (A., D. v. L.).
43. *Gymnetron villosulus* Gyll. (918), kogelvormig opgezwollen vruchten bij *Veronica Anagallis-aquatica* L. (D. v. L.).
44. *Mecinus collaris* Germ. (467), spoelvormige verdikkingen van de bloeiasse van *Plantago maritima* L. (D. v. L.).
45. *Saperda populnea* L. (491), spoelvormige of meer rondachtige opzwellingen van de jonge takken bij *Populus tremula* L. (D. v. L.).

Lepidoptera

46. *Grapholitha servillana* Dup. (744), spoel- tot cylindervormige zwellingen van de takken bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
47. *Phalonia atricapitana* Steph. (318), stengel gezwollen en verkort, bloemhoofdjes op elkaar gedrongen bij *Hieraceum umbellatum* L. (D. v. L.).

Itonididae

48. *Asphondylia mayeri* Liebel (768), langwerpige bulten bij de bases van de peulen van *Sarothamnus vulgaris* Winn. (D. v. L.).
49. *Asphondylia sarothamni* H. Lw. (764), gezwollen bladknoppen bij *Sarothamnus vulgaris* Winn. (D. v. L.).
50. *Contarinia barbichei* Kffr. (375), bovenste bladeren tot een geelachtige knop samengegroeid bij *Lotus corniculatus* L. (A.).
51. *Contarinia loti* Deg. (377), bloemen gezwollen en rood verkleurd bij *Lotus corniculatus* L. (A.).
52. *Contarinia nasturtii* Kffr. (113), „draaihartigheid” bij *Brassica oleracea* L. (D. v. L.).

53. *Contarinia rubicola* Ruebs. (675), bloemknoppen gesloten, kelkbladeren vergroot bij *Rubus caesius* L. (A.).
54. *Contarinia sorbi* Kffr. (811), blaadjes in de lengte samengevouwen bij *Sorbus aucuparia* L. (D. v. L.).
55. *Cystiphora sonchi* F. Lw. (810), ronde, lensvormige, meestal rode zwellingen op de bladeren bij *Sonchus arvensis* L. (A.).
56. *Dasyneura acer crispans* Kffr. (21), de bladeren zijn langs de nerven gevouwen, verdikt en rood bij *Acer Pseudo-platanus* L. (D. v. L.).
57. *Dasyneura affinis* Kffr. (934), verdikte en verkleurde rollingen van de bladrand bij *Viola canina* L. (A.).
58. *Dasyneura alni* F. Lw. (59), samenvouwing en plooiing van de jonge bladeren bij *Alnus glutinosa* Gaertn. (A.).
59. *Dasyneura crataegi* Wtz. (174), bladrozetten bij *Crataegus* species. (D. v. L.).
60. *Dasyneura galiicola* F. Lw. (275), bladrozet bij *Galium verum* L. (A.).
61. *Dasyneura kiefferiana* Ruebs. (210), bladrandrollingen bij *Epilobium angustifolium* L. (A.).
62. *Dasyneura plicatrix* H. Lw. (671a), gekroesde en langs de nerven bovenwaarts gevouwen bladeren van *Rubus fruticosus* L. (D. v. L.).
63. *Dasyneura trifolii* F. Lw. (878), samenklapping en verkleuring van de bladhelften bij *Trifolium repens* L. (A., D. v. L.).
64. *Dasyneura urticae* Perris (898), knobbelvormige, geelachtige zwellingen op de bladeren van *Urtica dioica* L. (D. v. L.).
65. *Dyodiplosis arenariae* Ruebs. (135), ovale verdikkingen aan de ondergrondse stengels, vaak in hoopjes bijeen bij *Carex arenarius* L. (D. v. L.).
66. *Geocrypta galii* H. Lw. (283), vlezige, vaak rode opzwellingen aan de stengel van *Galium verum* L. (D. v. L.).
67. *Giraudiella inclusa* Frfld. (441), binnenin de halm eenkamerige, harde galletjes bij *Phragmites communis* Trin. (P. N. VAN KAMPEN).
68. *Iteomyia capreae* Wtz. (721), ronde, 1—1½ mm grote galletjes op de bladeren van *Salix cinerea* L. (A., D. v. L.).
69. *Jaapiella veronica* Vallot (912, 917), zwelling van de bloemknoppen en samenvouwing van de twee hoogste blaadjes bij *Veronica officinalis* L. (D. v. L.).
70. *Macrodiplosis dryobia* F. Lw. (600), eind van een bladlob naar onderen toe omgeslagen bij *Quercus Robur* L. (D. v. L.).
71. *Massalongia rubra* Kffr. (103), spoelvormige verdikking van de hoofdnerf bij *Betula alba* L. (D. v. L.).
72. *Rhabdophaga heterobia* H. Lw. (736), losse bladrozetten met sterk behaarde bladbases bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
73. *Rhabdophaga iteobia* Kffr. (737), meer langwerpige bladrozetten met uitstaande bladpunten bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
74. *Rhabdophaga jaapi* Ruebs. (738), op grote knoppen lijkende, puntige bladrozetten bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
75. *Rhabdophaga rosaria* L. (735), wilgenroosje bij *Salix repens* L. (A., D. v. L.).
76. *Schizomyia galiorum* Kffr. (289), gezwollen, gesloten bloemen bij *Galium verum* L. (A.).
77. *Wachtliella persicariae* L. (472), rode, verdikte bladrandrollingen bij *Polygonum amphibium* L. (A., D. v. L.).

78. *Itonidide*, nieuwe gal, de katjes gekromd en onregelmatig verdikt, tussen de vruchtjes oranje galmuglarven bij *Betula alba* L. (D. v. L.).
79. *Itonidide* (742), zwakke verdikking van de takjes met rode larven bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
80. *Itonidide* (740), eind van de takjes knotsvormig verdikt, knoppen dicht bij elkaar bij *Salix repens* L. (D. v. L.).

Tenthredinidae

81. *Euura atra* Jur. (741), eenzijdige, vaak gekromde verdikkingen van de takken bij *Salix repens* L. (D. v. L.).
82. *Pontania bridgemanni* Cam. (718), boonvormige gallen, aan beide zijden van het blad uitstekend bij *Salix aurita* L. (A.) en bij *Salix cinerea* L. (D. v. L.). Vroeger *Pontania capreae* L. geheten.
83. *Pontania collactanea* Först. (747, 748), behaarde of onbehaarde, rode, bolronde bladgallen bij *Salix repens* L. (A., D. v. L.).
84. *Pontania leucaspis* Tischb. (725), losse, benedenwaarts gerolde bladrand bij *Salix cinerea* L. (D. v. L.).
85. *Pontania leucosticta* Htg. (724), gal als de vorige bij *Salix cinerea* L. (A., D. v. L.).
86. *Pontania pedunculi* Htg. (719), behaarde, bolvormige bladgallen bij *Salix cinerea* L. (D. v. L.).
87. *Pontania proxima* Lep. (692), zelfde gal als no. 82 bij *Salix alba* L. (D. v. L.). Vroeger *Pontania capreae* L. geheten.

Cynipidae

88. *Andricus collaris* Htg. forma *curvator* Htg. (595), bolvormige of ovale bladgallen met binnengal bij *Quercus Robur* L. (D. v. L.).
89. *Andricus ostreus* Htg. (617), kleine, rood gevlekte gallen op de nerven bij *Quercus Robur* L. (A.).
90. *Aulacidea hieracii* L. (319), spoelvormige opzwellingen van de stengels van *Hieracium umbellatum* L. (A.).
91. *Aylax hypochoeridis* Kffr. (332), spoelvormige verdikkingen van de bloeias bij *Hypochoeris radicata* L. (W. MARGADANT, D. v. L.).
92. *Cynips kollari* Htg. (569), harde, knikkervormige gallen uit de knoppen bij *Quercus Robur* L. (A.).
93. *Diplolepis folii* L. (619), knikkervormige, sponsachtige gallen aan de onderzijde van de bladeren bij *Quercus Robur* L. (A.).
94. *Neuroterus albipes* Schck. forma *laeviusculus* Schck. (613), platte, witte schijfjes op de onderzijde van de bladeren bij *Quercus Robur* L. (D. v. L.).
95. *Rhodites eglanteriae* Htg. (664), ronde, rode galletjes, meestal op de bovenzijde van de bladeren bij *Rosa spinosissima* L. (D. v. L.).
96. *Rhodites spinosissimae* Gir. (665), onregelmatige, afgeronde gallen aan beide zijden van het blad uitpuilend, ook op de kelkbladeren bij *Rosa spinosissima* L. (A., D. v. L.).

Isthmosomidae

97. *Isthmosoma hyalipenne* Walk. forma *maritima* Hed. (46), spoelvormige gallen aan het eind van de halmen bij *Agropyrum junceum* L. (D. v. L.).

Literatuur

- DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M., 1946, Gallenboek (met H. ALTA), Amsterdam.
 ———, 1947, Zoöcecidia van het eiland Ameland, Ent. Ber., 12: 181.
 ———, 1948, Zoöcecidia van het eiland Schiermonnikoog, Ent. Ber., 12: 217.
 ———, 1950, Zoöcecidia van het eiland Terschelling, Ent. Ber., 13: 168.
 ———, 1952, Zoöcecidia van het eiland Vlieland, Ent. Ber., 14: 99.
 ———, 1953, Nieuwe Gallen van Nederland, derde bijdrage, Ent. Ber., 14: 257.

Leersum, October 1952 en Mei 1953.

Polychrosis vitisana (Jacq. 1788) comb. nov., or new synonymy in an important pest of the grape-vine (Lepidoptera Tortricidae)

by

JIRI PACLT

The viticulture is suffering occasionally from the attack by larvae of the Tortricid called generally *Polychrosis botrana* (Den. & Schiff., 1775). KENNEL in his standard monograph on Tortricidae (1921, Zoologica 21: 54) mentions the following synonyms of that species: *reliquana* Tr. (nec Hb.!), *rosmarinana* Mill., and *vitivorana* Riley.

Now I may note that another description of the moth dates from 1788, when N. J. JACQUIN published Volume 2 of his "Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem, spectantia, cum figuris" (Vindobonae, ex officina Wappleriana). JACQUIN's diagnosis is accompanied by an excellent coloured plate which shows the larva, pupa, and imago (both in repose and wing-expansion), all these figures being partly in natural size, partly enlarged. Later, the plate ("Tab. 1") brings a figure of the larva feeding on *Vitis vinifera*, and a figure of the cocoon attached on the stem. The article in question is written in Latin and bears the title NICOLAI JOSEPHI JACQUIN "*Phalaena vitisana*" (pp. 97 to 100 of the volume 2). The description of the imago is repeated here (p. 100):

"*Phalaena tortrix*, elinguis, tres lineas longa, alis inferioribus utrinque, superioribus subtus uniformiter cinereis, omnibus margine posteriore ciliatis; superioribus superne ex testaceo fusco cinereoque nebuloze fasciatis, inferne eodem colore maculatis; antennis setaceis, alis duplo brevioribus, ex nigro cinereoque annulatis. Colores omnes modo pallidioribus sunt, modo intensiores; nec figura macularum constanter eadem in singulis."

Although C. D. SHERBORN (Index Animalium etc., sect. I, Cantabrigiae 1902) quotes JACQUIN's "Coll. Botan., 5 vols. 1786—1796" in the Bibliography (p. XXX), he does not mention *Phalaena vitisana* Jacq. at all. Also, no reference to this name can be found in the well-known catalogues of Lepidoptera, or monographs (STAUDINGER & REBEL, etc.).

Since the specific epithet *botrana* Den. & Schiff. is clearly a nomen nudum and all other synonyms (except *vitisana* Jacq.) are junior in respect to the name proposed by JACQUIN, the species under consideration is to be named *Polychrosis vitisana* (Jacq., 1788), comb. nov.

Bratislava IX (Czechoslovakia), Lamacká cesta 5, May 1953.

Afdelingsvergaderingen. De Afdeling Noord-Holland en Utrecht zal dit winterseizoen nog bijeenkomen op 25 November, 27 Januari en 10 Maart in Hotel Krasnapolsky.

De Afdeling Zuid-Holland vergadert op 18 December en 24 Maart in Den Haag en op 17 Februari in Leiden.

DE AFDELINGS-SECRETARISSEN.