

Ontwaken van *Nymphalis io* L. De excessief warme nacht van 24 op 25 Oct. heeft een op mijn slaapkamer overwinterende *Nymphalis io* L. doen ontwaken. Hij fladderde voortdurend tegen het raam. Daar het buiten stormde en regende, was het te voorzien, dat er van het diertje niet veel terecht zou komen als wij het naar buiten lieten. Het werd in een vangdoosje gedaan en naar de zolder verplaatst, waar het wel weer een schuilplaats gezocht zal hebben. Moet hier aan een door temperatuursverhoging voortijdige onderbreking van de winterslaap gedacht worden zonder voorafgaande koude, of staat dit feit op een lijn met de halfslaap der lievenheersbeestjes? Na het binnenkomen, anderhalve maand eerder, heeft het nooit meer in de steeds warme kamer gevlogen. Het opmerkelijke was, dat de vlinder gedurende de twee uur lange observatie steeds met volkomen uitgespreide vleugels ging zitten en ze nooit opklapte.

D. MAC GILLAVRY, Rusthuis „Charlois”, Amerongen.

Merkwaardige vindplaatsen van Coleoptera. In deel III van *Coleoptera Neerlandica* schrijft Dr EVERTS op bladzijde 392 bij *Anthicus bimaculatus* Mg.: „Merkwaardig is dat deze soort, eigen aan de zee kust, ook voorkomt op de grote zandvlakten (oude Tertiäirzee) bij Mombach en Darmstadt (L. van Heyden).” In April 1925 verzamelde ik deze soort op een droge zandheuvel te Soestduinen.

Ook werd door mij daar in een lager gelegen vrij vochtig gedeelte *Bembidion argenteolum* Ahr. gevangen, een loopkevertje, dat aan rivieroevers en duinplassen thuisbehoort.

A. C. NONNEKENS, Da Costalaan 48, Amstelveen.

Schaarse Lepidoptera in 1949. In vele delen van het land is voor *Papilio machaon* L. in 1949 na de bloeiperiode der laatste jaren een sterke terugslag gevolgd. Rupsen waren in het najaar slechts in zeer gering aantal te vinden op wortelveldjes, die anders in korte tijd een flinke serie opleverden. Ik houd mij aanbevolen voor mededelingen over het voorkomen van de soort in 1950.

In het voorjaar van 1949 waren de rupsen van *Philudoria potatoria* L. zeer schaars. Uren lang zoeken in twee terreinen, die voor deze soort beslist goed moeten zijn (plassen bij Maarseveen en Aalsmeer) leverde maar enkele dieren op. Ook uit het Oosten van het land kreeg ik slechts teleurstellende berichten. Een verklaring hiervoor is misschien het sterk door Diptera geparasiteerd zijn der rupsen in 1948. Uit een serie van Botshol kwam toen nauwelijks een enkele vlinder. Op andere vindplaatsen was het aantal aangestoken dieren niet zo ontstellend groot, maar stellig toch ook boven normaal. Ook bij deze soort moeten we er eens op letten, wanneer weer een herstel intreedt. — Lpk.

Dagvlindertabel. De Insectencommissie der N.J.N. publiceerde een keurig verzorgde tabel voor het op naam brengen der Nederlandse dagvlinders, samengesteld door KEES LEMS en JAN LUCAS. Zoals we dat van zulke frisse lieden mogen verwachten, is de gebruikte nomenclatuur die van de moderne tijd. — Lpk.

Correctie. p. 16, regel 2 van onderen, *lacteria* moet zijn: *lactearia*.