

Melitaea cinxia L. is. Maar de ontdekking van *büttneri* moest wachten tot een entomoloog (Dr K. G. BLAIR) zich metterwoon op het eiland vestigde en dus ook in de herfst op licht kon gaan vangen! Er zijn blijkbaar nog meer seizoensvangplaatsen dan Epen en de Waddeneilanden!

Een ontdekking, die voor ons weer van grote betekenis was, was de eerste Belgische vangst in 1947, toen een ♀ te Sutendael in Belgisch Limburg werd aangetroffen!

Overal vliegt de vlinder op moerassige of in elk geval laag gelegen terreinen, begroeid met riet, zeggen en dergelijke planten. Gelukkig zijn dergelijke stukjes natuur zelfs in ons haast benauwend dicht bevolkte land nog wel aan te treffen. Wie goede vliegplaatsen van *Arenostola pygmina* kent, kan er allicht eens een kans wagen met de lamp! Hij heeft dan in elk geval het goede biotoop te pakken.

N.B. Zo juist deelt de heer G. WARNECKE me nog 2 Duitse vindplaatsen van *büttneri* mee: Mooswald bij Freiburg in Baden (1935) en weilanden langs de Havel bij Zehdenick in de Mark (1947).

Literatuur

- BERGER, L., Espèces nouvelles pour la Faune belge, 1947, Lambillionea 47: 57—61.
 BLAIR, K. G., 1946, Notes from Freshwater, I.W., including a wainscot new to Britain, Ent. Mo. Mag. 82: 140—141.
 BOURSIN, Ch., Observations diverses, Captures, 1937, Bull. Soc. Ent. Fr. 42: 9.
 JUNG, H., 1941, *Sedina büttneri* Hering am linken Niederrhein, Ent. Zeitschr. Frankfurt 54: 244—248.
 ———, 1941, Nachtrag zu: *Sedina büttneri* Hering am linken Niederrhein, op. cit. 55: 49—50.
 URBAHN, E., 1933, Gehört die Noctuide *büttneri* Hering zur Gattung *Simyra*?, Stett. Ent. Z. 94: 136—153, 2 platen, fign.
 ———, 1933, Zur Lebensweise von *Sedina büttneri* Hering und *Pelosia obtusa* H.-S., op. cit. 94: 322—326, fig.
 TAMS, W. H. T., 1946, The discovery of *Sedina büttneri* Hering in the Isle of Wight, Entom. 79: 215—218, fig.

Summary

The first Dutch specimens of *Sedina büttneri* Hering, two ♂♂, were taken in October 1948 on a damp meadow in the neighbourhood of Eindhoven (prov. of North Brabant). Two other specimens were taken in September 1949 near Swalmen, a village in the prov. of Limburg. The map shows the Belgian, Dutch and Rhine province localities of the species.

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12III, Januari 1950.

Algemeen voorkomen van *Lucanus cervus* L. in Z. Limburg. Een van mijn analysten, de heer M. SPRONK, vertoefde deze zomer (1949) in de tweede helft van Juni te Schin op Geul. Het viel hem op, dat hij tijdens avondwandelingen langs de Noordelijke helling van het Geuldal aldaar een opmerkelijk groot aantal vliegende herten zag. Het opvallendste was dit op 29 en 30 Juni, toen van een half uur na zonsondergang af tientallen exx. van deze kever rondvlogen. Hij verzamelde enkele exx. voor mij. De mannelijke exemplaren varieerden sterk in grootte, de meeste waren klein (lengte zonder kaken ± 30 mm) en behoorden tot de var. *capreolus* Fuessly.

G. F. WILMINK, Burg. Dijkmeesterweg 23, Zutfen.