

H. *Rjabovana* Subg. nov. (fig. 6). Die mittellangen Palpen bis zur Spitze lang und dunkelbraun behaart, ähnlich wie bei *D. lentiscaria* Donz. und *D. distinctaria* Stgr., doch ist das Endglied kürzer und breiter; Gesicht ziemlich anliegend rauh und schmal beschuppt, nicht lang behaart wie bei *lentiscaria*, Körper schwächer als bei dieser. Gegenüber allen *Dyscia*-Arten ausgezeichnet durch den Besitz eines zweiten, fast ebenso langen, aber sehr spitzen, nicht gerundeten, säbelförmigen kostalen Fortsatzes nahe dem medialen Ende der Kosta. Dem Aedoeagus fehlen die langen gesägten Chitinspangen der *lentiscaria*.

Typus *D. negrama* Whli. sp. nov. Wahrscheinlich gehört hierher auch die noch nicht untersuchte *D. leucogrammaria* Püng.

Trotz des verschiedenen Baues stelle ich vorläufig auch die sonst recht ähnlichen *D. lentiscaria* und *distinctaria* hierher, die ebenfalls lang behaarte Palpen besitzen, obwohl der Gnathos der letzteren besser zu *D. fagaria* passen würde.

*D. tekkearia* Christ. (Seitz 4 : 408, Taf. 25 a) ist keine *Dyscia*, sondern gehört zu *Synopsidia phasidaria* Rghfr. (Suppl. 4 : 465). Siehe diese.

*D. Houlberti* Oberth. (Et. Léop. Comp. 20 : 203, Taf. 559, 561, fig. 4834, als *Scodiona*) hat sich als Noctuide herausgestellt, vielleicht nahe *Megaloctina mandarina* Leech (Seitz 3 : 412, Taf. 71 1), der sie etwas ähnlich sieht.

Basel, Claragraben 23, Dezember 1949.

Lepidopterologische notities. *Aporia crataegi* L. In April 1949 bij Norg als rups zeer gewoon. Practisch in elke lijsterbes zat een overwinteringspinsel.

*Boloria aquilonaris* Stichel (*arsilache* Esp.). In een veentje bij Norg 24 Juni 1949, na *Coenonympha tullia* Müller en *Ematurga atomaria* L. de meest gewone vlinder. De soort was er zeer gelocaliseerd.

*Leucoma salicis* L. 23 Mei 1949 zaten de rupsen in vele honderden langs de weg van Norg naar Donderen op de stammen van *Populus nigra* te vervellen.

*Callophasia lunula* Hufn. De rupsen waren in de herfst van 1948 in de omgeving van Heel vrij gewoon. Op elke behoorlijk met vlasleeuwenbek begroeide plek waren ze te vinden. Vele waren geparasiteerd.

*Sterrrha aversata* L., f. *aureo-spoliata* Boldt. Uit een rups van Vijversburg (Tietjerk).

*Epirrhoë tristata* L. Op 9 Mei 1949 ving ik een ex. bij Norg bij stormweer. Op 20 Mei ben ik in de buurt wat nauwkeuriger gaan zoeken en ontdekte toen een enigszins moerassige open plek in een dennenbos, geheel begroeid met *Galium*. Hier vloog de vlinder bij tientallen. Elders heb ik hem bij Norg nog niet kunnen ontdekken.

*Perizoma alchemillata* L. Omstreeks 21 Juni op een paar zeer beperkte terreintjes in de buurt van Leeuwarden, waar hennepnetel groeit, bij massa's. Overigens in de omgeving nog nooit waargenomen.

M. W. CAMPING, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden.