

Spitze jedoch schwarz. Corium mit schwarzem Fleck am Hinterrand, der den Aussenrand nicht erreicht und sich an der Brachialader nach vorn zieht. Cuneus hell, äusserste Spitze schwarz. Membran hell rauchgrau, hinterer Teil beider Zellen und ein Längsstreif hinter denselben dunkler.

Ich untersuchte 8 ♂♂ und 9 ♀♀ aus Holland ('s-Gravenhage 10-10-43, Rijnsburg Nov. '43 und Nieuw- en St. Joosland 29-9-46), GRAVESTEIN und BRAKMAN leg. Diese interessante Variante unterscheidet sich von den dunklen Formen der übrigen *Exolygus*-Arten durch das bis auf die äusserste Spitze helle Exocorium, das helle Pronotum, die Zeichnung des Scutellum und des Corium, sowie die lebhaft gezeichnete Membran. Sie erinnert durch Färbung und Zeichnung stark an *Lygus kalmi* L., ist aber viel grösser. Ich widme sie dem eifrigen Erforscher der holländischen Fauna, Herrn W. H. GRAVESTEIN, Amsterdam. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um eine Altersumfärbung handelt; denn alle Tiere der neuen Abart waren Herbsttiere (Sept.-Nov.). Für lebenswürdige Unterstützung bei dieser Arbeit bin ich Herrn W. H. GRAVESTEIN, Amsterdam, Herrn P. J. BRAKMAN, Nieuw- en St. Joosland, Herrn Prof. R. MAYNÉ, Brüssel, und Herrn Prof. A. REMANE, Kiel, zu grossem Dank verpflichtet. Ich möchte nicht versäumen, ihn auch an dieser Stelle noch einmal auszusprechen.

Schriften-Nachweis

1. WAGNER, Ed., 1949, Zur Systematik der Gattung *Lygus*, Verh. Ver. naturw. Heimatf. Hamburg 30: 26.
2. ——— 1949, Reihenuntersuchungen bei der U-G. *Exolygus*, Mitt. Naturw. Ver. Steiermark 30: 145.

Hamburg-Lgh. 1, Moorreihe 103, Westdeutschland, April 1950.

Cucullia chamomillae Schiff. op Duizendblad. Op 21 Juni 1949 bevond ik mij op speurtocht te Egmond aan Zee, toen mijn aandacht getrokken werd door een rups, die boven op de bloemtrossen zat van duizendblad (*Achillea millefolium* L.). Het gelukte mij nog enkele exx. van deze mooie, lichtgroen met zachtroze getinte rups te vinden. Ook nam ik enkele foto's. Aanvankelijk wist ik niet met welk dier ik te doen had, hoewel ik reeds vermoedde dat het *Cucullia chamomillae* Schiff. was. In „Svenska Fjärilar” trof ik een afbeelding aan, die mij bewees, dat mijn vermoeden juist was.

Het schijnt, dat *chamomillae* als rups wel meer aangetroffen wordt, maar dan bijna altijd op kamille. Het merkwaardige van deze vondst is dan ook wel, dat de voedselplant duizendblad was. De heer WESTERNENG zocht en vond enige dagen later eveneens te Egmond nog enkele exx., ook weer op duizendblad. De 5 rupsen, die ik gevonden had, deed ik in twee lucifersdoosjes. Zij verloochenden hun *Cucullia*-aard niet, want thuisgekomen kwam uit elk doosje één rups tevoorschijn. Eén rups verpopte en die is helaas doodgegaan. Vermeld kan nog worden, dat ik de rupsen verder ook met duizendblad gevoed heb en dat dit gretig geaccepteerd werd.

G. BANK JR., Koning Williamstraat 36, Zaandam.