

stellt. Weiter hat bei uns VAN IERSEL (briefl.) beobachtet, dass auch *Bembex rostrata* L. nach verlorener Beute sucht.

Wahrscheinlich ist dieses Verhalten bei den Grabwespen ziemlich algemeen. Von den solitären und sozialen Wespen wissen wir über das Suchen nach verlorener Beute vermutlich fast nichts, aus der Literatuur ist mir wenigstens nichts bekannt.

#### Literatuur

1. BAERENDS G. P., 1941, Fortpflanzungsverhalten und Orientierung der Grabwespe *Ammophila campestris* Jur. Tijdschr. v. Ent. 84: 68—275.
2. TINBERGEN, N., 1935, Über die Orientierung des Bienenwolfes (*Philanthus triangulum* Fabr.). II Die Bienenjagd, Zeitschr. f. vergl. Physiologie 21: 699—716.
3. TINBERGEN, N. und WILCKE, J., 1949: Hoornaar op jacht, De Lev. Nat. 52: 120.
4. VLEUGEL, D. A., 1950, Jagende hoornaars, De Lev. Nat. 53: 39.

Den Haag, A. de Haenstr. 53, November 1949.

---

### Boekaankondiging

door

B. J. LEMPKE

Prof. Dr RUDOLF RICHTER, Einführung in die Zoologische Nomenklatur durch Erläuterung der Internationalen Regeln.

In 1944 (Ent. Ber. 11: 218) besprak Dr C. O. VAN REGTEREN ALTENA uitvoerig de eerste druk van dit voortreffelijke werk. Inmiddels verscheen hiervan in 1948 een tweede oplage bij de Verlag Dr WALDEMAR KRAMER, Frankfurt a. M., Bornheimer Landwehr 57a. Het aantal pagina's is van 154 tot 252 uitgebreid. De van 1939—1947 gepubliceerde 61 Opinions werden geheel in het boek verwerkt, zodat de door de oorlog veroorzaakte achterstand is ingehaald.

Nieuw is de „Offizielle Liste zoologischer Gattungs-Namen“ (p. 211—233). De in vele Opinions verstrooide genus-namen zijn hier tot één rubriek verzameld, waarin alle namen alphabetisch gerangschikt zijn, elk met hun door de Commissie vastgestelde genotype. Nieuw is ook de lijst van publicaties, die door de Internationale Commissie al of niet nomenclatorisch geldig verklaard zijn met vermelding van de er bij behorende Opinion (p. 234—235).

Overigens kan volstaan worden met te verwijzen naar de uitvoerige bespreking van de eerste oplage en kan ook nu weer ieder systematicus de kennisname met het handige werk ten zeerste aanbevolen worden.

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstr. 12III, Maart 1950.

---

**Zwarte Eupithecia's.** Van de volgende inlandse soorten zijn zwarte vormen bekend: *tresignaria* H.S., *tripunctaria* H.S., *castigata* Hb., *innotata* Hufn., *virgaureata* Dbld., *lariciata* Frr., en het is natuurlijk niet onmogelijk, dat ze ook bij andere soorten zullen optreden. Het herkennen van al deze nikkers bij de vanglamp is meestal onmogelijk en ook later, als ze geprepareerd zijn, zullen ze nog heel wat moeilijkheden bezorgen. Maar de verspreiding van deze voor ons zeer moderne vormen is nog heel slecht bekend en daarom kan er niet genoeg op aangedrongen worden ze te verzamelen. Wie zelf geen preparaten kan maken en toch graag wil weten wat hij heeft, kan mij de dieren ter determinatie sturen. Van vier der zes genoemde soorten ken ik al zwarte exx. uit ons land. — Lpk.