

Deux nouveaux Clérides de Madagascar

par

MAURICE PIC

Les deux espèces décrites ici, représentées par des exemplaires uniques, font partie des collections du Zoölogisch Museum d'Amsterdam.

Pallenis cyanescens n. sp. — *Elongatus*, *fere opacus*, *albo pubescens* et *fusco hirsutus*, *nigro-coerulescens* et *albo signatus*, *labro*, *antennis ad basin pedibusque rufis*, *tibiis anticis pro parte nigris*; *elytris in singulo albo 4 maculatis (1, 1, 2 oblique dispositis)*, *maculis posticis internis approximatis*; *thorace pro parte albo notato*.

Allongé, presque opaque, en partie orné de pubescence blanche avec des poils foncés dressés, noir-bleuâtre, les élytres étant quadrimaculés de blanc. Antennes noires à base rousse; pattes rousses avec les tibias antérieurs en partie noirs. Tête avec le labre roux, à ponctuation pupilleuse et granuleuse dense, yeux transversaux, peu saillants. Thorax peu long, fortement globuleux-arrondi en avant, très étranglé postérieurement, orné de petites granules rapprochées et pubescent de blanc par places, sans dessins bien indiqués, base lisse et rebordée, teintée de verdâtre sur les côtés. Écusson densément pubescent de blanc. Elytres plus larges que le thorax, assez longs, subarrondis au sommet, à rangées de points assez gros, s'effaçant avant l'extrémité, qui est granulée, ornés chacun de quatre macules ainsi disposées: 1ère infrahumérale externe, 2ème antemédiane discale, 3ème postmédiane externe, 4ème très près de la suture, un peu plus bas que l'externe. Dessous du corps ayant deux macules blanches latérales. — Long. 10 millim. — Maroantsetra.

Se rapproche (ex description) de *Stenocylidrus novemguttatus* Fairm.; il en diffère au moins par la coloration spéciale des pattes. Me semble être un *Pallenis* Cast. et non pas à placer dans les *Stenocylidrus* Spin.

Pallenis albonotata n. sp. — *Elongatus*, *opacus*, *paulo pubescens*, *niger*, *albo notatus*, *antennis ad basin rufis*, *elytris in singulo albo bisignatis*, *macula prima discoidalis et antemediana*, *secunda subtransversa*, *postmediana et externa*.

Allongé, opaque, peu pubescent, entièrement noir avec seulement les parties buccales et la base des antennes d'un jaune-rougeâtre. Thorax assez long, large et subarrondi vers le milieu, un peu échancré en avant, rétréci vers la base et droit sur cette partie, à ponctuation dense, en partie pupilleuse ou granuleuse, une trace de ligne médiane blanche devant l'écusson. Écusson petit, blanc. Élytres plus larges que le thorax, peu longs, subarrondis au sommet, à rangées de points forts, prolongées presque jusqu'à l'extrémité (celle-ci granuleuse), peu déprimés vers le milieu, ayant chacun une macule antemédiane discale, subarrondie et une macule transversale postmédiane externe, celles-ci blanches. Dessous du corps à deux grosses macules blanches externes. — Long. 6 millim. — Maroantsetra.

Espèce caractérisée par son aspect mat, la coloration presque entièrement noire et la 2ème macule blanche des élytres subtransversale. Paraît se rapprocher par son aspect de *melaleucus* Fairm., décrit comme *Stenocylidrus* Spin.