

Oporinia christyi Prout (Lep., Geom.) nieuw voor de Ned. Fauna.

Door de heer LEMPKE hiertoe aangespoord, besloot ik in de prachtige herfst van 1948 een grote serie *Oporinia*'s te vangen. Ik kon zonder veel moeite in de bossen tussen Epen en Vaals ruim 100 gave exx. bij elkaar brengen. Dit was alleen mogelijk door het droge zonnige herfstweer, daar bij nat koud weer verse exx. moeilijk te vinden zijn.

De heer LEMPKE werkte toen deze serie nader voor mij uit, met als uitslag dat ongeveer drie kwart tot *Oporinia christyi* bleek te behoren en de rest tot *Oporinia dilutata* Schiff. Het verschil tussen deze 2 soorten is niet groot, maar de kenmerken, die LEMPKE aangeeft, lijken mij toch wel voldoende om beide soorten uit elkaar te kunnen houden. Bij een serie gave exx. is het verschil zelfs duidelijk te zien. Ik heb ook de rupsen gekweekt van beide soorten van verschillende voedselplanten om de beweringen van PROUT in SEITZ te controleren, maar heb tot nu toe omtrent de verschillen in tekening en kleur en de voorkeur voor een bepaalde boomsoort nog niets definitiefs kunnen vinden, hoewel ik enkele beweringen in twijfel meen te mogen trekken. Verder onderzoek zal dit wel uitwijzen.

M. DELNOYE, Molenbeekstraat 3, Sittard.

[Zie ook Cat. Ned. Macrolep. IX : (637) en (640)—(641). — Lpk.]

Scopula marginepunctata Goeze. Bij het doorkijken van de verzameling van de heer J. WINTERS te Vollenhove zag ik tot mijn grote verrassing een paar aldaar gevangen exx. van *Sc. marginepunctata*. Toen we 's avonds (14 Aug.) op licht gingen vangen aan de zoom van de rietkragen der Beulaker Wijde, kwamen ook een paar prachtige gave *marginepunctata*'s op de lamp af. In de eerste plaats is het biotoop natuurlijk merkwaardig, maar zeker niet minder de vindplaats. Vergelijk Cat. VIII : (585)! Nu ik het land van Vollenhove zelf gezien heb met zijn vele walletjes, dicht begroeid met eik, sleedoorn, hop enz., kan ik me overigens best voorstellen, dat in dit gebied wel het een en ander te vinden is.

Jammer is slechts de houding van een deel der inboorlingen. We genoten 's avonds de belangstelling van zeker veertig min of meer opgeschoten lieden. Dat er nogal eens geestigheden gedebiteerd werden, konden we best hebben. Maar dat er later papierproppen en zelfs keien aan te pas kwamen, werd minder leuk. Gelukkig moest tegen half elf ieder naar bed. Het is ook dit soort publiek, dat de nesten der purperreigers buiten het beschermde gebied vernielde, de eieren vertrapte en de jongen vermoordde. Mijn hulde aan de heer WINTERS, die zich door al deze aanmoedigen niet laat afschrikken, maar onverdroten voortgaat dit interessante gebied verder te onderzoeken. — Lpk.

Insecten op Amerikaanse eik. De heer K. LEMS vond 2 Oct. 1949 een volwassen rups van *Lophopteryx capucina* L. (*camelina* L.) op Amerikaanse eik te Amersfoort. — Lpk.

Plusia gamma L., f. nigricans Spuler. Begin September ving ik te Aalten een vers en zeer donker ex. van *Plusia gamma*, waarbij op de goudvlekken na bijna alle tekening verdwenen is.

H. G. VAN GALEN, Haartse straat 80, Aalten.