

vertoont op 1P6 links en rechts een *gibberipes*-bultje. Ik heb voor deze eigenaardige afwijkingen van de soort *variegator* nimmer een verklaring kunnen vinden, noch in de literatuur hierover iets ontmoet. Het was daarom een verrassing in bovengenoemde publicatie van RAMAZZOTTI een afbeelding No. 8 op pag. 341 aan te treffen van een *variegator* ♀, met bultjes op 1P6 l. en r., alsmede een afbeelding No 7 op pag 340, van *longipalpis* Magl. 1924 ♀ (= *curvipalpis* ♂ Ram. 1947 + *cetrata* ♀ Ram. 1947), met een bultje op 1P6 r.

RAMAZZOTTI zegt hiervan, dat hij bij zijn *gibberipes*-exx. er heeft gezien met bultjes in verschillende stadia van ontwikkeling; er waren er ook, die behalve de bultjes op de 1e poten ze ook bezaten op de eindleden van het 2e pootpaar, links of rechts. Andere exx. vertoonden een bultje op 1P6 of 2P6, links of rechts. In totaal bestudeerde RAMAZZOTTI 21 exx. van *gibberipes*. Ten slotte concludeert R., dat *F. gibberipes* geen goede soort is, doch een abnormaliteit. Hiermede kan worden ingestemd.

Dat RAMAZZOTTI zijn *gibberipes* identificeert met *longipalpis* Magl. 1924 (= *cetrata* Ram. 1947), is juist, doch zijn *gibberipes* is iets anders als *gibberipes* Protz 1900, daar de eerste 25-28 nappen bezit en de tweede 14-19.

RAMAZZOTTI vond ook nog 2 ♀♀ van *F. variegator* (KOCH 1837) met het *gibberipes*-kenmerk. Het 1e ♀ draagt het bultje op 1P6 l. en r., het 2e ♀ op 1P6 en 2P6 in beide gevallen l. en r.

Resumerende mag gezegd worden, dat er thans 3 *F.*-soorten bekend zijn, die de *gibberipes*-abnormaliteit kunnen vertonen:

1. De soort, waarvan *gibberipes* Protz 1900 de abnormaliteit is. Welke soort is dat? M.i. komen hiervoor in aanmerking *F. brevipes* Neum. 1880 of *F. curvipalpis* Viets 1930. De vindplaatsen van deze afwijking zijn als boven vermeld, O. Pruisen en bij Parijs.

2. De soort *longipalpis* Maglio 1924 (= *curvipalpis* Ram. 1947 ♂ + *cetrata* Ram. 1947 ♀). Uit de tabellen van R. blijkt, dat hij 437 ♀♀ vond zonder, en 21 ♀♀ met afwijkingen. Deze werden tot nu toe alleen gevonden in het Lago Maggiore.

3. De soort *variegator* (Koch 1837) s.l., waarvan de afwijkingen dus zijn gevonden in het Lago Maggiore en in Nederland.

Arrenurus (Truncaturus) truncatellus (O.F.M. 1776). F.n.sp. Vindplaats: Sloot Deuteren, 's-Bosch, April.

's Hertogenbosch, Koningsweg 30, Augustus 1950.

Notodonta tritophus Esp. (Lep.) 21 Juli ving ik als nieuwe vangst voor Nuenen een *tritophus* op licht. Van *Heteropterus morpheus* Pall. ving ik dit jaar 5 exx., alle op 13 Juli.

H. C. C. NEIJTS, Voortsestr. D 69 G, Nuenen.

Afdelingsvergaderingen winterseizoen 1950—1951. De Afd. „Noord-Holland en Utrecht” zal nog op 13 Dec. 1950 en 7 Maart 1951 bijeen komen, telkens des avonds te kwart voor 8 in Hotel „Krasnapolsky”, Warmoesstraat, Amsterdam.

De data van de vergaderingen der Afd. „Zuid-Holland” zijn: 20 December en 14 Maart (in Den Haag), 14 Februari (in Leiden).

De Afdelings-Secretarissen.